

Nonpres 50 mg 30 tabletek powlekanych

Nasza cena: 46,23 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLFA PABIANICE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	EPLERENONUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Eplerenon substancja zawarta w leku jest wskazana jako:

- dodatkowa terapia do standardowego leczenia w celu zmniejszenia ryzyka umieralności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów w stanie stabilnym z zaburzeniem czynności lewej komory serca oraz klinicznymi objawami niewydolności serca po przebytych niedawno zawale serca.
- dodatkowa terapia do standardowego leczenia, w celu zmniejszenia ryzyka umieralności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z (przewlekłą) niewydolnością serca oraz z zaburzeniami czynności lewej komory serca.

Dawkowanie:

Pacjenci z niewydolnością serca po przebytych zawale serca:

- zalecana dawka podtrzymująca eplerenonu wynosi 50 mg raz na dobę.

Leczenie należy zaczynać od dawki 25 mg raz/dobę, którą należy stopniowo zwiększać, najlepiej w ciągu 4 tygodni

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca:

- leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg raz na dobę, a następnie stopniowo zwiększać, najlepiej w ciągu 4 tygodni

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana dzienna porcja do spożycia.

Działanie:

Eplerenon wykazuje względną swoistość wiązania z rekombinowanymi ludzkimi receptorami dla mineralokortykosteroidów w porównaniu do wiązania z rekombinowanymi ludzkimi receptorami dla glikokortykosteroidów, progesteronu i androgenów. Eplerenon zapobiega wiązaniu aldosteronu, kluczowego hormonu w układzie renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), który uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego i patofizjologii chorób sercowonaczyniowych.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 25 mg eplerenonu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjentów występują którekolwiek z poniższych dolegliwości:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- stężenie potasu w surowicy przed rozpoczęciem leczenia powyżej 5,0 mmol/l.
- ciężka niewydolność nerek,
- ciężka niewydolność wątroby.
- jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu
- leczenie skojarzone inhibitorem ACE i antagonistą receptora angiotensyny (ARB) i eplerenonem.

Działania niepożądane:

Najczęstsze działania niepożądane jakie występują podczas stosowania leku to:

- infekcje,
- hiperkaliemia,
- zawroty głowy,
- omdlenia,
- zawał serca,
- niedociśnienie tętnicze,
- kaszel,
- biegunka,
- nudności,
- zaparcia,
- wysypka,
- świąd,
- skurcze mięśni,

- ból mięśniowo-szkieletowy,
- niewydolność nerek,
- zwiększone stężenie mocznika we krwi.

Jeżeli pacjent chce uzyskać więcej informacji na temat działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.