

NORMATENS (IMP.ROW.ŁOTWA) *20

Nasza cena: 10,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CLOPAMIDUM, DIHYDROERGOCRISTINUM, RESERP

Opis produktu

Opis

Skład:**1 tabletkę drażowaną zawiera:**

Clopamidum (klopamid) - 5,0 mg;

Dihydroergocristinum - 0,5 mg (w postaci dihydroergokrystyny mezylanu – 0,58 mg)

Reserpinum (rezerpina) - 0,1 mg.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 tabletkę drażowaną zawiera 44,8 mg sacharozy i 44,9 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania do stosowania:

- Pierwotne nadciśnienie tętnicze i wszystkie postaci wtórnego nadciśnienia tętniczego, w których monoterapia jest nieskuteczna.

- Produkt może być stosowany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, takimi jak leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, leki rozszerzające naczynia krwionośne.

Dawkowanie:

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dawkowanie u pacjentów dorosłych:

Dawka początkowa wynosi zwykle: 1 tabletkę drażowaną na dobę. W zależności od skuteczności leczenia oraz ewentualnej obecności i nasilenia działań niepożądanych, dawkę tę można zwiększać do maksymalnie 3 tabletek drażowanych na dobę, podawanych w 3 dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancje czynne, sulfonamidy, alkaloidy sporyszu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- Hipokaliemia.
- Cięża i laktacja.

Działania niepożądane:

Wszystkie działania niepożądane zostały zawarte w ulotce informacyjnej którą można znaleźć w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku. Jeżeli pacjent ma jakiegokolwiek wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.