

Norprolac 75 mcg, 30 tabletek

Nasza cena: 124,06 zł

Opis słownikowy

Dawka	75MCG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	FERRING GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	QUINAGOLIDUM

Opis produktu

Opis

Norprolac 75 mcg, 30 tabletek

Pobierz ulotkę

Skład:

1 tabletkę zawiera 75 mikrogramów chinagolidu (Quinagolidum) w postaci chinagolidu chlorowodoru.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną.

Postać farmaceutyczna:

Tabletki Norprolac 75 mikrogramów: białe, okrągłe, płaskie, z fazowanymi krawędziami, o średnicy 7 mm. Napisy: na jednej stronie kolisty napis „NORPROLAC”, na drugiej stronie liniowy napis „75”.

Wskazania do stosowania:

Hiperprolaktynemia (samoistna lub spowodowana mikro- lub makrogruczolakiem przysadki wydzielającym prolaktynę).

Dawkowanie:

Dawkę optymalną leku Norprolac należy ustalać indywidualnie, biorąc pod uwagę stopień zmniejszenia stężenia prolaktyny i tolerancję produktu.

Dorośli:

Leczenie rozpoczyna się od „opakowania startowego” - przez pierwsze 3 doby podaje się po 25 mikrogramów na dobę, a przez kolejne 3 doby po 50 mikrogramów na dobę.

Od siódmego dnia zalecana dawka wynosi 75 mikrogramów na dobę. W razie potrzeby, można stopniowo zwiększać dawkę dobową o 75 mikrogramów w odstępach nie krótszych niż 1 tydzień, aż do uzyskania zadowalającego efektu leczniczego. Przeciętą dawką podtrzymująca wynosi 75 lub 150 mikrogramów na dobę.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Działania niepożądane:

Wszystkie działania niepożądane zostały wyszczególnione w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzący bądź zasięgnąć porady farmaceuty.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.