

# Novate 0,05% krem, 30 g

Nasza cena: 18,14 zł

## Opis słownikowy

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Opakowanie        | 30 g                       |
| Postać            | KREM                       |
| Producent         | Pharmaswiss Czechy [Cz]    |
| Rejestracja       | Lek na receptę pełnopłatny |
| Substancja czynna | CLOBETASOLUM               |

## Opis produktu

### Opis

## Novate 0,05% krem, 30 g

propionian klobetazolu

### Działanie

- przeciwwysiękowe
- przeciwzapalne
- przeciwalergiczne
- rzeciwswiądowe

### Wskazania do stosowania:

- łuszczyca
- liszaj płaski
- liszaj rumieniowaty przewlekły

### Co zawiera i jak działa Novate - krem?

Krótkotrwałe leczenie opornych dermatoz, takich jak łuszczyca (z wyłączeniem rozległej postaci wysiękowej), liszaj płaski i rumieniowaty przewlekły oraz innych dermatoz, których leczenie kortykosteroidami o słabszym działaniu okazało się nieskuteczne. Preparat nakładać na zmienioną chorobowo skórę 1 x/d, do ustąpienia objawów. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tyg., a ilość stosowanej w ciągu tygodnia maści lub kremu nie powinna przekraczać 50 g. Jeśli nastąpi zaostrzenie choroby, leczenie można powtórzyć, ale powinno być krótkotrwałe. Jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia kortykosteroidami, należy zastosować kortykosteroid o słabszym działaniu. Jeśli po 2–4 tyg. leczenia nie wystąpi poprawa, rozważyć zweryfikowanie rozpoznania. W przypadku zmian chorobowych opornych na leczenie z towarzyszącym nadmiernym rogowaceniem preparat można zastosować na noc pod opatrunkiem okluzyjnym; w dalszym leczeniu zwykle wystarczające jest stosowanie leku bez opatrunku. W przypadku stosowania na skórę twarzy czas leczenia ograniczyć

do 5 dni, nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.

### Kiedy nie stosować preparatu Novate - krem?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, trądzik różowaty lub pospolity, dermatozy okołoustne, pierwotne wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna), świąd odbytu i okolicy narządów płciowych, pierwotne grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, pieluszkowe zapalenie skóry.

Nie stosować długotrwale.

Nie stosować u dzieci w 1. roku życia

Nie stosować na skórę pod pieluchą.

### Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na klobetazol, inne glikokortykosteroidy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, trądzik różowaty, trądzik pospolity, dermatozy okołoustne, opryszczkę zwykłą, ospę wietrzną, świąd narządów płciowych i okolic odbytu, okres po szczepieniach ochronnych.

Gdy przyjmujesz leki immunosupresyjne lub immunostymulacje. Lek może nasilać działanie leków immunosupresyjnych i osłabiać - immunostymulujących. Lek może zmniejszać skuteczność szczepień ochronnych.

**Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.**

### Skutki uboczne

Uczucie pieczenia, podrażnienie, świąd, rozstępy na skórze, nadmierne owłosienie, zmiany pigmentacyjne skóry.

W przypadku długotrwałego stosowania preparatu obserwowano wystąpienie zespołu Cushinga, miejscowych atroficznych zmian skórnych.

W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy o nich poinformować lekarza.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.