

NovoMix Insulin aspart 50 Penfill 100 j/ml 5 wkł. 3 ml

Nasza cena: 38,27 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Dawka | 3ML*5 |
| Opakowanie | 100JM/ML |
| Producent | NOVO NORDISK A/S DANIA [DK] |
| Rejestracja | Lek na receptę |
| Substancja czynna | INSULINUM ASPARTUM |

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Preparat przepisuje się z przepisu lekarza w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 10 do 12 lat.

Dawkowanie:

Dawkę ustala i indywidualnie lekarz na podstawie stwierdzonego zapotrzebowania na insulinę.

Sposób podawania:

NovoMix Insulin podaje się podskórnie, bezpośrednio przed posiłkiem. Jeżeli wystąpiła taka konieczność można preparat podać w krótkim czasie po posiłku.

Miejsca iniekcji:

- powłoki brzuszne (działanie najszybsze),
- udo,
- górną część ramienia
- pośladek.

Zalecane jest każdorazowa zmiana miejsca wstrzyknięcia.

Działanie:

- obniżenie poziomu cukru we krwi

Skład:

1 wkład aplikowany do wstrzykiwacza zawiera 300 j.m. rozpuszczalnej insuliny aspart/insuliny krystalizowanej z protaminą w proporcji 30:70. (ampułka 3 ml)

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na insulinę aspart
- nadwrażliwość na pozostałe składniki preparatu
- hipoglikemia

Działania niepożądane:

Początkowy okres stosowania preparatu może skutkować obrzękami oraz zaburzeniami refrakcji. Najczęstszym zaobserwowanym działaniem niepożądanym było wystąpienie hipoglikemii, która objawia się wystąpieniem takich objawów jak:

- zlewne poty
- pobudzenie nerwowe
- błądność powłok
- niepokój
- drżenia
- uczucie zmęczenia
- uczucie osłabienia
- stan splątania
- zaburzenia koncentracji
- senność
- uczucie silnego głodu
- zaburzenia widzenia
- ból głowy
- nudności i kołatanie serca

W przypadku wystąpienia któregoś z objawów należy niezwłocznie poinformować lekarza, ponieważ ciężka hipoglikemia wymaga natychmiastowej interwencji.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.