

## Nurofen, czopki dla dzieci, 125 mg, 10 szt.



Nasza cena: 30,03 zł

### Opis słownikowy

Dawka	125MG
Opakowanie	*10
Postać	CZOPKI
Producent	FARMEA FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany do objawowego leczenia bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego oraz w objawowym leczeniu gorączki.

#### Dawkowanie - Nurofen, czopki dla dzieci, 125 mg, 10 szt.

12,5 kg do 17 kg (2 do 4 lat) 1x1 czopek (125mg) 1 czopek co 8 godzin (maksymalnie 375 mg ibuprofenu na dobę)

#### Składniki - Nurofen, czopki dla dzieci, 125 mg, 10 szt.

1 czopek zawiera 125 mg ibuprofenu oraz substancję pomocniczą: tłuszcz stały.

#### Działania

Klinicznie wykazano skuteczność ibuprofenu w leczeniu bólów o nasileniu słabym do umiarkowanego jak np. bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów, bóle głowy, bóle uszu, bóle gardła, bóle pooperacyjne, bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich i gorączki, w tym spowodowane odczynem poszczepiennym, jak również w bólu i gorączce występujących w przebiegu grypy.

#### Przeciwwskazania - Nurofen, czopki dla dzieci, 125 mg, 10 szt.

Lek Nurofen dla dzieci jest przeciwwskazany u pacjentów:

- z nadwrażliwością na ibuprofen oraz inne NLPZ lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały skurcz oskrzeli, astma, katar lub pokrzywka w wywiadzie,
- czynną lub przebytą chorobą wrzodową oraz u osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego,
- z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek oraz z niekontrolowaną niewydolnością serca,
- z układowym toczeniem rumieniowatym,
- z ciężką niewydolnością serca,

- nie należy przyjmować w ostatnim trymestrze ciąży.

### Przeciwwskazania - Nurofen, czopki dla dzieci, 125 mg, 10 szt.

- Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd.
- Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty.
- Bardzo rzadko: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, oliguria, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zaburzenia czynności wątroby, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, ciężkie reakcje skórne (m.in. rumień wielopostaciowy), ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich (jako powikłania w przebiegu ospy wietrznej), obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotonia, wstrząs, nasilenie objawów astmy, objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja, szczególnie u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**