

Nurofen dla dzieci forte truskawkowy zawiesina doustna, 100ml



Nasza cena: 35,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	ZAW.DOUST.
Producent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

Opis produktu

Opis

Nurofen dla dzieci forte truskawkowy zawiesina doustna, 100ml

Wskazania do stosowania

- Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego
- Objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki

Właściwości

- Zawiesina doustna od 3. miesiąca życia.
- Smak truskawkowy
- Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
- Skuteczny także w zwalczaniu gorączki poszczepiennej.
- Skoncentrowana dawka – mniej płynu do połknięcia.
- Zaczyna działać już po 15 minutach
- Działa przeciwgorączkowo do 8 godzin

Nurofen dla dzieci Forte zawiesina charakteryzuje przede wszystkim formuła, która zapewnia odpowiednio silne działanie dzięki skoncentrowanej zawartości ibuprofenu, co sprawia, że dziecko przyjmuje mniej płynu do połknięcia. Dodatkowo posiada bardzo wygodną oraz precyzyjną w podaniu strzykawkę, co zapewnia bezpieczeństwo jeśli chodzi o ilość leku. Wskazania do stosowania to leczenie gorączki różnego pochodzenia, w tym także: objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki.

Sposób użycia

Lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania doustnego. Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.