

Nurofen dla dzieci Forte, zawiesina doustna, 50 ml



Nasza cena: 18,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50ml
Postać	ZAW.DOUST.
Producent	Reckitt Benckiser Healthcare
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Zawiesina doustna od 3 miesiąca życia.

Dawkowanie - Nurofen dla dzieci Forte, zawiesina doustna, 50 ml

Doustnie. Lek przeznaczony do stosowania doraźnego u dzieci. Dawka dobową: 20-30 mg ibuprofenu na kilogram masy ciała w dawkach podzielonych. Niemowlęta 6-12 miesiąc życia (7,7-9 kg): 1,25 ml 3-4 razy dziennie (150-200 mg/dobę). Dzieci od 1 do 3 roku życia (10-15 kg): 2,5 ml 3 razy dziennie (300 mg/dobę). Dzieci 4-6 rok życia (16-20 kg): 3,75 ml 3 razy dziennie (450 mg/dobę). Dzieci 7-9 rok życia (21-29 kg): 5 ml 3 razy dziennie (600 mg/dobę). Dzieci 10 - 12 rok życia (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy dziennie (900 mg/dobę). Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml 3 razy dziennie. Preparat można również stosować (wyłącznie na zlecenie lekarza) w przebiegu odczynu poszczepiennego u niemowląt 3-6 miesiąc życia (5-7,6 kg): 1,25 ml 2 razy dziennie (drugą dawkę podać po 6 godzinach). Bez porozumienia z lekarzem nie stosować u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia (lub o masie ciała mniejszej niż 7 kg).

Składniki - Nurofen dla dzieci Forte, zawiesina doustna, 50 ml

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze.

Działania

- Przeciwbólowe
- przeciwgorączkowe
- przeciwzapalne

Wskazania - Nurofen dla dzieci Forte, zawiesina doustna, 50 ml

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: ból głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle w przebiegu ząbkowania, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwwskazania - Nurofen dla dzieci Forte, zawiesina doustna, 50 ml

Możliwe skutki uboczne: Reakcje nadwrażliwości, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (bóle w nadbrzuszu, nudności, niestrawność). Brak danych dotyczących niekorzystnego wpływu leku na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Poinformuj lekarza: Gdy dziecko ma nadwrażliwość na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, astmę oskrzelową. Gdy dziecko przyjmuje inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leki moczopędne, obniżające ciśnienie, doustne leki przeciwzakrzepowe, preparaty litu, metotreksat, zydowudynę.

Uwagi

Smak truskawkowy.

Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.