

Nurofen Ultima, 200mg+500mg, tabletki powlekane, 12 szt.



Nasza cena: 10,39 zł

Opis słownikowy

Dawka	200MG+500MG
Opakowanie	*12
Postać	TABL.POWL.
Producent	Reckitt Benckiser Healthcare
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Lek zawiera dwie substancje czynne: ibuprofen i paracetamol.

Dawkowanie - Nurofen Ultima, 200mg+500mg, tabletki powlekane, 12 szt.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.

Dorośli: przyjąć 1 tabletkę z jedzeniem lub pić do 3 razy na dobę. Należy zachować, co najmniej 6 godzinną przerwę między kolejnymi dawkami. Jeśli po przyjęciu jednej tabletki objawy nie ustępują można przyjąć maksymalnie 2 tabletki do 3 razy na dobę.

Składniki - Nurofen Ultima, 200mg+500mg, tabletki powlekane, 12 szt.

Każda tabletkę zawiera 200mg ibuprofenu i 500mg paracetamolu, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kwas stearynowy, otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, talk, makrogol, potasu glinokrzemian, polisorbate.

Działania

Ibuprofen należy do grupy leków określanych jako NLPZ. Działanie tej grupy leków polega na zmniejszaniu bólu, zmniejszaniu obrzęku oraz obniżaniu wysokiej temperatury ciała. Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym, który działając inaczej niż ibuprofen, łagodzi ból i gorączkę.

Wskazania - Nurofen Ultima, 200mg+500mg, tabletki powlekane, 12 szt.

Leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych, bólu mięśni, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, leczeniu objawów przeziębienia oraz grypy, bólu gardła i gorączki.

Przeciwwskazania - Nurofen Ultima, 200mg+500mg, tabletki powlekane, 12 szt.

Owrzodzenia żołądka, perforacja lub krwawienie, uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku, kwas acetylosalicylowy, przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy powyżej 75mg na dobę.

Przeciwwskazania - Nurofen Ultima, 200mg+500mg, tabletki powlekane, 12 szt.

- Zgaga, niestrawność, objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, objawy zapalenia opon mózgowych, reakcje alergiczne.
- Często: bóle brzucha lub złe samopoczucie, nudności lub wymioty, biegunka.
- Niezbyt często: ból głowy i zawroty głowy, gazy i zaparcia, wysypka, obrzęk twarzy, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub zwiększenie płytek krwi.
- Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby krwinek, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach, splątanie, dezorientacja, depresja, omamy, zmęczenie, ogólne złe samopoczucie, ostre reakcje skórne w tym powstawanie pęcherzy, wysokie ciśnienie krwi, problemy z wątroba, problemy z nerkami, zaburzenia pracy serca

Uwagi

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.