

# Nurofen zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 ml



Nasza cena: 19,36 zł

## Opis słownikowy

Producent	Boots Healthcare Intern. /boots Company/
Rejestracja	Lek bez recepty

## Opis produktu

### Opis

Przeciwzapalna zawiesina o smaku truskawkowym.

### Dawkowanie - Nurofen zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 ml

Przed użyciem należy wstrząsnąć. Do opakowanie dołączony jest dozownik w formie strzykawki z podziałką ułatwiającą dawkowanie. Dozownik należy mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki. Aby napełnić dozownik, butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesunąć tłok dozownika do dołu wciągając zawiesinę do pożądanego miejsca na podziałce. Po zastosowaniu dozownik i jego części należy umyć.

3-6 miesięcy (5 - 7,6 kg) - 2,5 ml  
6-12 miesięcy (7,7 - 9 kg) - 2,5 ml  
1 - 3 lata (10 - 15 kg) - 5 ml  
4-6 lat (16 - 20 kg) - 7,5 ml  
7-9 lat (21 - 29 kg) - 10 ml  
10-12 lat (30 - 40 kg) - 15 ml

### Składniki - Nurofen zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 ml

100 mg ibuprofenu oraz Polisorbit 80, glicerol, syrop maltitolowy, sól sodową sacharyny, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, gumę ksantanową, chlorek sodu, esencję truskawkową 500244E, bromek domifenu, wodę oczyszczoną.  
Nie zawiera cukru, alkoholu ani barwników.

### Wskazania - Nurofen zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 ml

Leczenie gorączki różnego pochodzenia, w tym gorączki spowodowanej przebiegiem zakażeń wirusowych, odczynem poszczepiennym.  
Leczenie bólów różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego jak np.:

- bóle głowy, gardła i mięśni, np. w przebiegu zakażeń wirusowych,
- bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne,
- bóle zębów, bóle po ekstrakcji zębów, bóle na skutek ząbkowania,
- bóle głowy,
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

## Przeciwwskazania - Nurofen zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 ml

Leku nie należy stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku oraz na inne NLPZ
- występowania kiedykolwiek w przeszłości objawów alergii w postaci kataru, pokrzywki skórnej lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ,
- czynnej lub przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy.

## Uwagi

Stosując Nurofen dla dzieci rodzice powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli u dziecka stwierdzono wcześniej: astmę oskrzelową, niewydolność wątroby, nerek lub krążenia, objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego, wrodzoną nietolerancję fruktozy (ze względu na możliwość przekształcenia maltitolu, jednego ze składników pomocniczych, we fruktozę).

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**