

Octenisept do dezynfekcji ran aerozol 50 ml

Nasza cena: 23,12 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml
Postać	PLYN
Producent	SCHULKE & MAYR NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	OCTENIDINUM, PHENOXYETHANOLUM

Opis produktu

Opis

Octenisept do dezynfekcji ran aerozol 50 ml

Octenisept przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi.

Skład

100g Octenisept zawiera: dichlorowodorek octenidyny - 0,1g; alkohol fenoksyetylowy - 2,0g;

substancje pomocnicze: octan dimetyloamoniowy, kwas amidopropylokokosowy, glukonian sodu, wodorotlenek sodu, glicerol 85%; woda oczyszczona do 100g.

Właściwości

- gotowy do użycia lek do ran i błon śluzowych;
- skuteczna alternatywa dla dotychczas stosowanych substancji aktywnych np. PVP - jod, organiczne związki rtęci;
- dobrze tolerowany przez błony śluzowe i skórę, nie powoduje drażnienia ran;
- bezbolesne stosowanie;
- szybkie działanie;
- efekt działania do 1 godziny;
- substancje aktywne nie ulegają wchłanianiu;
- bezbarwny, nie pozostawia plam.

Wskazania

Octenisept przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi:

- w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrici, wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii i oddziałach zakaźnych;
- przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych;
- przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych;
- przy płukaniu ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiośrodków, itp.;
- przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych;
- w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołądki prącia mężczyzny;
- przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym;
- przy cewnikowaniu;
- przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi;
- przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie;
- do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem IUP;
- przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem;
- przed badaniami andrologicznymi;
- w pediatrii;
- do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.

Szulke Polska
Schulke Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.