


Oftagel, 2,5mg/g, żel do oczu 10 g



Nasza cena: 23,35 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dawka | 2,5MG/G |
| Opakowanie | 10g |
| Postać | ZEL D/OCZU |
| Producent | SANTEN OY FINLANDIA [FI] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | CARBOMERUM |

Opis produktu

Opis

Oftagel, żel do oczu ma postać przejrzystego lub lekko opalizującego roztworu zawierającego w swym składzie jako substancję czynną: karbomer.

Więcej o kroplach do oczu znajdą Państwo w artykule " Krople do oczu – jakie mają działanie i w jaki sposób je stosować".

Dawkowanie - Oftagel, 2,5mg/g, żel do oczu 10 g

Zazwyczaj stosowana dawka preparatu Oftagel, żel do oczu, w zależności od zaawansowania objawów, to 1 kropla do worka spojówkowego 1 do 4 razy na dobę.

Składniki - Oftagel, 2,5mg/g, żel do oczu 10 g

Substancja czynna: karbomer 2,5 mg/g.

Substancje pomocnicze: chlorek benzalkoniowy 0,06 mg/ml, sorbitol 45 mg/ml, lizyna jednowodna 4,7 mg/ml, octan sodu 0,7mg/ml, alkohol poliwinylowy 5 mg/ml i woda do wstrzykiwań do 1 g.

Działania

Ważnymi właściwościami kropli do oczu mających łagodzić objawy zespołu "suchego oka" są: utrzymywanie ciągłości warstwy łez chroniącej oko oraz dobre właściwości smarujące. Karbomer będący nowym usieciowanym polimerem o dużej masie cząsteczkowej, zwiększa lepkość kropli do oczu i przedłuża czas kontaktu z okiem zmniejszając przy tym samym podrażnienie oka.

Wskazania - Oftagel, 2,5mg/g, żel do oczu 10 g

Znajduje on zastosowanie w leczeniu suchego zapalenia rogówki i spojówki i leczeniu objawowym innych postaci zespołu "suchego oka", tj. w sytuacjach, gdy gruczoły łzowe wydzielają mniej lub nie produkują wcale własnej wydzieliny i wysychanie rogówki powoduje wystąpienie niepożądanych objawów na powierzchni oka.

Przeciwwskazania - Oftagel, 2,5mg/g, żel do oczu 10 g

Nie należy stosować preparatu Oftagel, żel do oczu w przypadku występowania nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazania - Oftagel, 2,5mg/g, żel do oczu 10 g

Bezpośrednio po podaniu preparatu, mogą przemijająco wystąpić zaburzenia widzenia, pieczenia lub objawy miejscowego podrażnienia.

Uwagi

W trakcie stosowania preparatu nie należy nosić miękkich soczewek kontaktowych, a twarde soczewki kontaktowe należy usunąć przed podaniem preparatu do oka. Ponowne włożenie twardych soczewek kontaktowych możliwe jest dopiero po upływie 15 minut od podania leku.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu Oftagel, żel do oczu u ciężarnych i karmiących piersią nie było przedmiotem osobnych badań. Oftagel może ograniczać ostrość widzenia. Zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu, należy odczekać aż ustąpią, występujące bezpośrednio po podaniu preparatu, zaburzenia widzenia. Okres trwałości otwartej butelki to jeden miesiąc. Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 oC), w miejscu niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.