

Oftahist 1 mg/ml krople do oczu, 5 ml



Nasza cena: 29,34 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 MG/ML
Opakowanie	5ml
Postać	KROP.DO OCZU
Producent	ADAMED SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	OLOPATADINUM

Opis produktu

Opis

Oftahist 1 mg/ml krople do oczu, 5 ml

Oftahist jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób alergicznych oczu. Jego działanie polega na zmniejszeniu nasilenia reakcji uczuleniowych. Lek jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z rozpoznaniem sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek objawiającym się świądem, łzawieniem, zaczerwienieniem oraz obrzękiem powiek i spojówek. Objawom tym często towarzyszy wodnisty katar, kichanie lub swędzenie w nosie i uszach. Pojawiają się one nagle i mają ostry, jednak przemijający przebieg i mogą być wywołane przez niektóre substancje alergenne (alergeny), w tym pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt.

Wskazania

Leczenie objawów ocznych u dorosłych pacjentów z rozpoznaniem sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Zmniejszenie nasilenia reakcji uczuleniowych oka wywołanych alergenami.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę (rano i wieczorem), bezpośrednio do worka spojówkowego.

Należy zachować odstęp co najmniej 8 godzin pomiędzy zakropieniem dawek.

Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Czas leczenia wynosi do dwóch tygodni. W przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów w ciągu trzech dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy po konsultacji lekarskiej, jednak nie należy stosować leku dłużej niż 4 miesiące.

Skład

Substancję czynną: olopatadyna w postaci chlorowodoru 1mg,
substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.