

Olej Rycynowy PhytoPharm, 100 g



Nasza cena: 8,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 g
Producent	PhytoPharm Dobrzyca Sp. Z O.o.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat polecany w ostrych i przewlekłych zaparciach.

Dawkowanie - Olej Rycynowy PhytoPharm, 100 g

O ile lekarz nie zaleci inaczej, dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 15-30 ml (1-2 łyżki stołowe). Wypróżnienie następuje po około 3 lub 7 godzinach od przyjęcia leku. Stosować raz na dobę.

Składniki - Olej Rycynowy PhytoPharm, 100 g

Olej rycynowy (Oleum Ricini FP IV).

Działania

Oleum Ricini PhytoPharm otrzymuje się w wyniku tłoczenia na zimno nasion rącznika pospolitego. Olej rycynowy jest silnym środkiem przeczyszczającym. Preparat podany doustnie ulega w jelicie cienkim rozpadowi do gliceryny i kwasu rycynolowego. Proces ten odbywa się w obecności żółci i soku trzustkowego. Następnie kwas rycynolowy ulega stopniowemu zmydłaniu do mydeł sodowych i potasowych. Kwas i mydła wykazują działanie drażniące, wzmagają perystaltykę jelita cienkiego, zwiększają również przenikanie wody i elektrolitów przez ściany jelit, ograniczając równocześnie jej wchłanianie. Wypróżnienie następuje w ciągu 2-4 godzin po podaniu oleju rycynowego.

Przeciwwskazania - Olej Rycynowy PhytoPharm, 100 g

Nie należy stosować leku:
- w przypadku nadwrażliwości na olej rycynowy

- w stanach zapalnych narządów jamy brzusznej
- w przypadku niedrożności jelit
- w przypadku niedrożności dróg żółciowych oraz innych schorzeń dróg żółciowych
- w przypadku krwawienia odbytniczego
- gdy występują bóle brzucha, nudności, wymioty, ciąża, menstruacja.

Przeciwwskazania - Olej Rycynowy Phytopharm, 100 g

Lek może powodować nudności, wymioty, dolegliwości skurczowe (kolka), bóle brzucha i gwałtowną biegunkę. W rzadkich przypadkach obserwowano występowanie wysypki skórnej.

Uwagi

Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.