

Olfen 75 SR 30 tabletek 75 mg

Nasza cena: 9,62 zł

Opis słownikowy

Dawka	75MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	MEPHA-PHARMA A G SZWAJCARIA [CH]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	DICLOFENACUM

Opis produktu

Opis

Wskazania w stosowaniu Olfen 75 SR:

- leczenie objawowe bólu i stanów zapalnych ostrych stanów zapalnych stawów
- leczenie objawowe przewlekłych stanów zapalnych stawów
- leczenie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa innych zapalnych reumatycznych chorób kręgosłupa

Dawkowanie:

Czas stosowania leku ustala lekarz indywidualnie na podstawie stanu pacjenta oraz rodzaju i nasilenia bólu. W przypadku przepisania przez lekarza tabletki 75 mg ogólna, zalecana dawka dobową stosowaną u dorosłych wynosi 50-150 mg diklofenaku sodowego.

Jednorazowa dawka stosowana u dorosłych wynosi 1 tabletkę, czyli 75 mg diklofenaku sodowego. Całkowita dawka dobową dla dorosłych wynosi od 1 do 2 tabletek 75-150 mg diklofenaku sodowego.

Działanie:

- przeciwreumatyczne
- przeciwzapalne
- przeciwbólowe
- przeciwgorączkowe

Głównym mechanizmem działania substancji czynnej jest hamowanie biosyntezy prostaglandyn, które uczestniczą w patogenezie procesu zapalnego, bólu i gorączki.

Skład:

1 tabletkę powlekana o przedłużonym uwalnianiu, zawiera 75 mg diklofenaku sodowego.

Przeciwwskazania:

Wszystkie przeciwwskazania umieszczone zostały na ulotce dołączonej do opakowania.

Do najważniejszych zaliczamy:

- nadwrażliwość na substancję czynną
- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą
- czynna choroba wrzodowa
- choroba żołądka
- choroba dwunastnicy
- krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja
- ostatni trymestr ciąży
- choroba niedokrwienia serca
- choroba naczyń obwodowych

Działania niepożądane:

Szczegółowe działania niepożądane znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania Leku.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego
- Zaburzenia układu immunologicznego
- Zaburzenia psychiczne
- Zaburzenia układu nerwowego
- Zaburzenia oka
- Zaburzenia ucha i błędnika
- Zaburzenia serca
- Zaburzenia naczyń
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.