


Olfen Patch plastry 2 sztuki w opakowaniu



Nasza cena: 24,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*2
Postać	PLASTER
Producent	MEPHA LDA PORTUGALIA [PT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DICLOFENACUM

Opis produktu

Opis

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Substancją czynną preparatu jest diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenyllooctowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Diklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego.

Wskazania:

Preparat jest wskazany miejscowo w łagodzeniu bólu spowodowanego nagłym nadwyrężeniem, zwichnięciem lub stłuczeniem w urazach kończyn (w następstwie np. kontuzji sportowych).

Przeciwwskazanie:

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen). Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane:

- u osób, u których występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
- na otwarte rany lub na uszkodzoną skórę (otarcia, skaleczenia, oparzenia) oraz na zmiany skórne (egzema, infekcja skórna)
- u kobiet w III trymestrze ciąży.

Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży do 16. roku życia jest przeciwwskazane

Sposób użycia:

Preparat ma postać plastra leczniczego do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Na bolące miejsce naklejać 1 plaster 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Nie stosować więcej niż 2 plastry lecznicze na dobę. Jeżeli ból pourazowy występuje w kilku miejscach plaster leczniczy można stosować tylko na jedno z tych miejsc. Nie należy stosować plastra pod opatrunkiem okluzyjnym, nie przepuszczającym powietrza. W razie potrzeby można zastosować bandaż elastyczny. Plastra nie należy dzielić na części. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Bez konsultacji z lekarzem preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni. Dłuższe stosowanie preparatu powinno odbywać się pod kontrolą lekarza i nie może przekraczać 7 dni.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.