

Omnic Ocas 0,4 30 tabletek 0,4 mg

Nasza cena: 9,17 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,4MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	ASTELLAS PHARMA SP.Z.O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TAMSULOSINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania w stosowaniu:

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. BPH).

Dawkowanie:

1 tabl./dobę, można przyjmować niezależnie od posiłku lub 1 kaps./dobę, po śniadaniu lub po 1-szym posiłku. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku do 18 lat.

Działanie:

Tamsulosyna jest wybiórczym, kompetycyjnym antagonistą postsynaptycznych receptorów adrenergicznych typu α_1 , a zwłaszcza podtypów α_{1A} i α_{1D} , powodującym rozkurcz mięśniówki gładkiej gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Skład:

1 tabletkę powlekana o przedłużonym uwalnianiu, zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodoru. 1 kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodoru.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy; niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie; ciężka

niewydolność wątroby.

Uwagi:

Tabletka lub kapsułka należy połknąć w całości i nie należy jej przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.