

## Opokan, tabletki, 10 szt.

Nasza cena: 8,09 zł



### Opis słownikowy

Dawka	7,5 MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MELOXICAMUM

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych.

#### Dawkowanie - Opokan, tabletki, 10 szt.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Przyjmować doustnie jedną tabletkę dziennie. Przyjmować razem z posiłkiem, popijając wodą.

#### Składniki - Opokan, tabletki, 10 szt.

1 tabletkę zawiera meloksykam 7,5 mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

#### Działania

Lek Opokan zawiera meloksykam, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. Mechanizm polega na preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1.

#### Przeciwwskazania - Opokan, tabletki, 10 szt.

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- nadwrażliwość na inne leki z grupy NLPZ,
- jeżeli podczas stosowania leków z grupy NLPZ wystąpiły napady duszności, bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk naczynioruchowy,

- ciężka niewydolność nerek lub wątroby,
- dializy,
- czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- wylew krwi do mózgu lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
- ciężka niewydolność serca,
- w okresie ciąży (III trymestr) i podczas karmienia piersią,
- poniżej 15 roku życia.

### Przeciwwskazania - Opokan, tabletki, 10 szt.

- często: niestrawność, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka, niedokrwistość, obrzęki, uczucie pustki w głowie, bóle głowy, świąd, wysypka.
- niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, przemijające zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia morfologii, szumy uszne, kołatania serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia czynności nerek z pokrzywką.
- rzadko: perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzjg, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwość, bezsenność, zaburzenia widzenia, koszmary nocne, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, niewydolność nerek.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**