

Optisterin 30 kapsułek

Nasza cena: 26,14 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	TARCHOMIŃSKIE ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "POLFA" POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Optisterin 30 kapsułek

Suplement diety, który zawiera składniki wspierające utrzymanie odpowiedniego stężenia cholesterolu we krwi:

- **Fitosterole roślinne** wspierają prawidłowy poziom cholesterolu.
- **Tiamina** wspiera funkcjonowanie serca.
- **Witamina B6, witamina B12** oraz **kwas foliowy** wspomagają metabolizm homocysteiny oraz wspierają prawidłowe tworzenie krwinek czerwonych.

Zalecana dzienna porcja

1 kapsułka w ciągu dnia.

Składniki

Składnik	Zawartość w 1 kapsułce (*RWS)
Ekstrakt z czerwonego ryżu	72,5 mg
Monakolina K	2,9 mg
Fitosterole roślinne	157,9 mg
Omega-3 z alg	50 mg

DHA	5,5 mg
Witamina B6	1,4 mg (100% RWS*)
Tiamina	1,1 mg (100% RWS*)
Kwas foliowy	200 µg (100% RWS*)
Witamina B12	2,5 µg (100% RWS*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: estry fitosteroli (0,95 g/100 g), żelatyna wołowa, substancja wypełniająca - celuloza; skrobia, ekstrakt ze sfermentowanego czerwonego ryżu – źródło monakolin, sproszkowane mikroalgi Schizochytrium sp. (źródło kwasu DHA), substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, talk), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), barwnik (dwutlenek tytanu).

Środki ostrożności

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia.

Optisterin nie jest przeznaczony dla osób, które nie muszą kontrolować swojego stężenia cholesterolu we krwi.

Należy unikać spożycia dodatku steroli roślinnych w ilościach większych niż 3 g na dobę.

Pacjenci zażywający leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinni spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przed zastosowaniem suplementu diety należy określić stężenie cholesterolu we krwi oraz skonsultować się z lekarzem.

Optisterin nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią, dzieci w wieku poniżej 18 lat i osoby dorosłe w wieku powyżej 70 lat.

Należy zwrócić się o poradę do lekarza w sprawie spożycia tego produktu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

Nie należy spożywać w przypadku zażywania leków obniżających stężenie cholesterolu.

Nie należy spożywać, w przypadku zażywania innych produktów zawierających sfermentowany czerwony ryż.

Nie spożywać dziennie ilości równej lub wyższej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego ryżu.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.