

Orofar Junior 24 tabletek do ssania



Nasza cena: 18,53 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*24
Postać	TABL.D/SSANIA
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZOXONII CHLORIDUM, LIDOCAINUM

Opis produktu

Opis

Orofar wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe.

Działanie:

Kompleksowe działanie

- przeciwbólowe
- przeciwbakteryjne
- przeciwwirusowe
- przeciwgrzybiczne

Zmniejsza ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Lidokaina zawarta w leku jest środkiem miejscowo znieczulającym. Łagodzi ból gardła pojawiający się w czasie infekcji oraz towarzyszący przełykaniu.

Wskazanie:

infekcje gardła

- infekcje jamy ustnej
 - stany zapalne dziąseł
 - zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej
 - afty
- ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani
- pomocniczo w leczeniu zapalenia migdałków (angina)
- zapobieganie tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej

Dawkowanie:

Dorośli

Ssać powoli 1 tabletkę co 2 lub 3 godziny. W przypadku nasilonej infekcji dawkę można zwiększyć do 1 tabletki co 1 lub 2 godziny. Nie należy przyjmować więcej niż 10 tabletek na dobę.

W przypadku leczenia aft należy pozwolić tabletkę rozpuszczać się powoli w pobliżu miejsca zmienionego chorobowo.

Dzieci powyżej 6 lat

Dzieci powyżej 6 lat nie powinny przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Nie należy stosować produktu leczniczego Orofar[®] u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Produktu Orofar[®] nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład:

Tabletki do ssania

1 mg benzoksoniowego chlorku + 1 mg lidokainy chlorowodoru

Chlorek benzoksoniowy jest silnym środkiem działającym bakteriostatycznie i bakterioobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Działa skutecznie zwłaszcza wobec bakterii odpowiedzialnych za infekcje jamy ustnej i gardła oraz uczestniczących w tworzeniu płytki nazębnej. Wywiera także działanie grzybobójcze i słabe przeciwwirusowe wobec wirusów posiadających otoczkę lipidową (wirusy grypy, paragrypy oraz herpeswirusy).

Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym. Łagodzi ból gardła oraz spowodowany infekcją ból towarzyszący przełykaniu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.