

Orofar Max, 20 pastylek twardych



Nasza cena: 21,77 zł

Opis słownikowy

Dawka	1MG+2MG
Opakowanie	*20
Postać	PASTYL.TWARDA
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CETYLPYRIDINIUM, LIDOCAINUM

Opis produktu

Opis

Orofar Max, 20 pastylek twardych

Lek Orofar Max ma postać tabletek do ssania. Zawiera dwie substancje czynne: chlorek cetylopirydyniowy i chlorowodorek lidokainy. Zawarte w leku olejki miętowe i lewomentol nadają pastylkom miętowy smak.

Dawkowanie - Orofar Max, 20 pastylek twardych

Doustnie, pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy żuć ani połykać. Nie należy stosować leku Orofar Max podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2-3 godziny w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylkę co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Leku Orofar Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Składniki - Orofar Max, 20 pastylek twardych

1 pastylka: 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoorku oraz substancje pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Działania

Chlorek cetylopirydyniowy - substancja o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działająca bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.

Chlorowodorek lidokainy - substancja o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.

Wskazania - Orofar Max, 20 pastylek twardych

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach.

Przeciwwskazania - Orofar Max, 20 pastylek twardych

Nie stosować leku Orofar MAX jeśli stwierdzone jest uczulenie (nadwrażliwość) na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Orofar MAX.

Możliwe działania nieporządane - Orofar Max, 20 pastylek twardych

Rzadko mogą wystąpić przemijające podrażnienie jamy ustnej i gardła, mogą także wystąpić nudności i wymioty. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna.

Uwagi

Jeżeli ból gardła jest połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami, przed zastosowaniem leku Orofar MAX należy zwrócić się po poradę do lekarza.

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Nie należy stosować dłużej niż 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią: Lek Orofar MAX może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie na zlecenie lekarza. Leku Orofar MAX nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Lek Orofar MAX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeżeli jest stosowany w zalecanych dawkach.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.