

Orofar Max, 30 pastylek twardych



Nasza cena: 32,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	2 MG+1 MG
Opakowanie	*30
Postać	PASTYL.TWARDA
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CETYLPYRIDINIUM, LIDOCAINUM

Opis produktu

Opis

Orofar Max, 30 pastylek twardych

Pastyłki o smaku miętowym.

Dawkowanie - Orofar Max, 30 pastylek twardych

Doustnie, pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy żuć ani połykać. Nie należy stosować podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

1 pastylkę co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Składniki - Orofar Max, 30 pastylek twardych

Substancjami czynnymi leku są cetylopirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowodorek. Jedna pastylka zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru.

Inne składniki leku to olejki miętowy z liści mięty pieprzowej, olejki miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Działanie

Lek Orofar Max ma postać pastylek do ssania. Zawiera on 2 substancje czynne:
chlorek cetylopirydyniowy - substancję o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działającą bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.
chlorowodorek lidokainy - substancję o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.

Wskazania - Orofar Max, 30 pastylek twardych

Lek stosowany w miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu dolegliwości bólowych w tych stanach.

Przeciwwskazania - Orofar Max, 30 pastylek twardych

Nie stosować leku:
jeśli stwierdzone jest uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, oraz inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów.

Możliwe działania nieporządane

- Rzadko może wystąpić przemijające podrażnienie jamy ustnej i gardła, mogą także wystąpić nudności i wymioty
- W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.
Leku Orofar Max nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.