

Orsalit dla dorosłych, saszetki, 10 sztuk



cena: 23,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP. POLSKA [PL]

Opis produktu

OPIS

Orsalit to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia. Orsalit uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ogranicza nasilenie biegunki. Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza. Produkt zawiera **cukier**. Produkt **bezglutenowy, nie zawiera białka mleka i laktozy**. Preparat przeznaczony **dla osób dorosłych**. Smak malinowo-cytrynowy.

SKŁADNIKI

glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat, aromaty naturalne

Wartość odżywcza	W 100 g produktu w saszetkach	W 100 ml produktu gotowego do spożycia	W 200 ml produktu gotowego do spożycia
wartość energetyczna (energia)	1591 kJ/374 kcal	35 kJ/8 kcal	71 kJ/17 kcal
tłuszcz	0 g	0 g	0 g
w tym			
- kwasy tłuszczowe	0 g	0 g	0 g

nasycone (kwasy nasycone)			
węglowodany	93,60 g	2,08 g	4,16 g
w tym			
- cukry (glukoza)	60,53 g	1,35 g	2,70 g
białko	0 g	0 g	0 g
sól	19,10 g	0,43 g	0,85 g
składniki mineralne			
chlorki	10270 mg	230 mg	460 mg
sód	7640 mg	170 mg	340 mg
potas	3530 mg	160 mg	320 mg

Osmolarność roztworu: 245 mOsm/l.

MASA NETTO

44,6 g (10 saszetek po 4,46 g)

SPOSÓB UŻYCIA

Przed otwarciem wstrząsnąć saszetką. Zawartość aromatów naturalnych może powodować zbrylanie się i/lub zmianę zabarwienia proszku, co nie wpływa na jakość produktu. Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Płynu nie należy dosładzać. Orsalit można podawać przez rurkę. Przed podaniem schłodzić. W przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką).

DAWKOWANIE

Ilość, dobową dawkę oraz czas stosowania preparatu ORSALIT dla dorosłych, które wpływają na wywołanie efektu zdrowotnego, są uzależnione od wieku, masy ciała i fazy nawadniania.

Podane poniżej zasady stosowania preparatu ORSALIT dla dorosłych uwzględniają aktualnie zalecenia WHO/UNICEF dotyczące nawadniania doustnego.

	Faza nawadniania (pierwsze 3-4 godziny nawadniania)	Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania)
Zalecenia WHO/UNICEF	Zalecana dawka płynu nawadniającego: około 50/100 ml/kg m.c. po każdym biegunkowym stolcu i 2-5 ml/kg m.c. po każdym epizodzie wymiotów	Zalecana dawka płynu nawadniającego: około 50/10 ml/kg m.c. po każdym biegunkowym stolcu i 2-5 ml/kg m.c. po każdym epizodzie wymiotów

Przykładowe dawkowanie preparatu ORSALIT dla dorosłych

ORSALIT dla dorosłych	Faza nawadniania (pierwsze 3-4 godziny nawadniania)	Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania)
	3-8 saszetek rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (600-1600 ml)	1 saszетка rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

OSTRZEŻENIA

Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza). W przypadku chorób współistniejących należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

BIOMED SA
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków