

Orsalit, saszetki, 10 sztuk

Nasza cena: 20,78 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP. POLSKA [PL]

Opis produktu

OPIS

Orsalit to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia. Orsalit uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ogranicza nasilenie biegunki. Orsalit nie zawiera dodatków smakowych i przeznaczony jest w szczególności **dla niemowląt poniżej 6 miesięcy życia i dzieci skłonnych do alergii.**

Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza.

Produkt zawiera cukier.

Produkt **bezglutenowy, nie zawiera białka mleka i laktozy.**

Odpowiedni dla alergików

SKŁADNIKI

glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu.

Wartość odżywcza	W 100 g produktu w saszetkach	W 100 ml produktu gotowego do spożycia	W 200 ml produktu gotowego do spożycia
wartość energetyczna (energia)	1586 kJ/373 kcal	38 kJ/9 kcal	76 kJ/18 kcal
tłuszcz	0 g	0 g	0 g
w tym			
- kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone)	0 g	0 g	0 g

węglowodany	93,30 g	2,26 g	4,52 g
w tym			
- cukry (glukoza)	70,03 g	1,62 g	3,24 g
białko	0 g	0 g	0 g
sól	14,28 g	0,35 g	0,70 g
składniki mineralne			
chlorki	7340 mg	180 mg	360 mg
sód	5710 mg	140 mg	280 mg
potas	3250 mg	80 mg	160 mg

Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l.

MASA NETTO

48 g (10 saszetek po 4,80 g)

SPOSÓB UŻYCIA

Przed otwarciem wstrząsnąć saszetką. Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Płynu nie należy dosładzać. Orsalit można podawać przez rurkę. Przed podaniem schłodzić. W przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką).

DAWKOWANIE

Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza. Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Przykładowe dawkowanie preparatu ORSALIT

Osoba otrzymująca ORSALIT	Faza nawadniania (pierwsze 3-4 godziny nawadniania)	Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania)
Masa ciała do 4 kg (wiek: do 4 miesięcy)	1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
Masa ciała od 4 kg do 8 kg (wiek: do 6 miesięcy)	2 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (400 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	
Masa ciała od 8 kg do 12 kg (wiek: od 6 miesięcy do 1 roku)	3 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (600 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	

Masa ciała od 12 kg do 15 kg (wiek: od 1 roku do 2 lat)	4 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (800 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
Masa ciała powyżej 15 kg (wiek: powyżej 2 lat)	6 saszetek rozpuszczonych zgodnie z zaleceniem (1200 ml) Podawać w ciągu 3-4 godzin	

OSTRZEŻENIA

Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza). W przypadku chorób współistniejących należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

BIOMED SA
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków