

Ortanol Max, 20 mg, 7 kapsułek



Nasza cena: 9,24 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-------------------|
| Dawka | 20MG |
| Opakowanie | *7 |
| Postać | KAPS. |
| Producent | Sandoz Gmbh Kundl |
| Rejestracja | Lek bez recepty |

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany do krótkotrwałego leczenia objawów refluksu żołądkowo- przełykowego u dorosłych.

Dawkowanie - Ortanol Max, 20 mg, 7 kapsułek

Doustnie. 1 kapsułka na dobę przez 14 dni. Jeśli objawy nie ustąpią po tym czasie, należy skonsultować się z lekarzem. Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano. Kapsułki można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek). Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą. Kapsułek nie wolno żuć ani zgniatać. W przypadku trudności w połykaniu kapsułki można ją otworzyć i albo połknąć jej zawartość, popijając wodą, albo wsypać zawartość do szklanki niegazowanej wody, dowolnego kwaśnego soku owocowego. Wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem. Mieszaninę wypić do razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

Składniki - Ortanol Max, 20 mg, 7 kapsułek

Każda kapsułka zawiera 20mg omeprazolu, HPMC, tytanu dwutlenek (E171) hydroksypropylometyloceluloza.

Działania

Inhibitor pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Hamuje wydzielanie kwasu solnego.

Wskazania - Ortanol Max, 20 mg, 7 kapsułek

Preparat jest przeznaczony do stosowania u osób z objawami cofania treści żołądkowej do przełyku, odczuwających dolegliwości pieczenia przełyku (zgaga).

Przeciwwskazania - Ortanol Max, 20 mg, 7 kapsułek

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby leczeni klarytromycyną. Pacjenci leczeni atazanawirem lub nelfinawir. Należy zachować ostrożność podczas terapii skojarzonej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Nie stosować u pacjentów z występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu

Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Przeciwwskazania - Ortanol Max, 20 mg, 7 kapsułek

Często: bóle głowy, biegunka, ból żołądka, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, nudności, wymioty. Niezbyt często: obrzęk stóp i okolicy kostek, zaburzenia snu, zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, senność, zawroty głowy, zmiany w wynikach badań czynności wątroby, wysypka skórna, złe samopoczucie, brak energii. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien wpływać na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie mniej jednak niektóre osoby podczas stosowania leku Ortanol Max mogą odczuwać takie działania niepożądane jak np.: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, senność. W przypadku wystąpienia tego typu działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Uwagi

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2 lub 3 kolejne dni. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.