

Ototalgin, krople do uszu 10 g



Nasza cena: 26,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 g
Postać	KROP.DO USZU
Producent	FARMINA KRAKÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CHOLINI SALICYLAS

Opis produktu

Opis

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, stosowany w stanach zapalnych ucha, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Skład i działanie:

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) salicylan choliny. Salicylan choliny jest pochodną kwasu salicylowego i podobnie jak inne salicylany wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Podstawą mechanizmu działania NLPZ, w tym salicylanów, jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz, enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania salicylanów. Możliwe jest także, że preparat hamuje działanie innych substancji aktywujących receptory bólowe oraz innych mediatorów stanu zapalnego. Po podaniu miejscowym do ucha preparat nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Wskazania:

Stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego objawiające się bólem, świądem, zaczerwienieniem, a także przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego w przypadku obecności stwardniałej woskowiny.

Dawkowanie:

Preparat ma postać kropli do uszu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Należy zakraplać do chorego ucha 3–4 krople 2–4 razy na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Sposób stosowania:

Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego do ucha. Wkraplanie należy wykonywać u chorego leżącego na boku, z uchem zwróconym ku górze. Po zakropleniu chory powinien pozostać w tej pozycji kilka minut.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.