

Otrivin Allergy, aerozol, 15 ml



Nasza cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15ml
Postać	AEROSOL
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA SZWAJCARIA [CH]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PHENYLEPHRINUM, DIMETINDENUM

Opis produktu

Opis

Otrivin Allergy, aerozol, 15 ml

Preparat przeznaczony jest do stosowania na błony śluzowe nosa, jego aktywność nie zależy od stężenia składników czynnych w surowicy.

Dawkowanie - Otrivin Allergy, aerozol, 15 ml

Otrivin Allergy należy stosować po dokładnym oczyszczeniu nosa. Dorośli oraz dzieci powyżej 6. roku życia: 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego, 3 do 4 razy na dobę; ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.

Składniki - Otrivin Allergy, aerozol, 15 ml

1 dawka: maleinian dimetindenu 2,5 mg, fenylefryna 2,5 mg, substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy, deterpenowany, woda oczyszczona

Działania

Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa; hamuje działanie histaminy odpowiedzialnej za reakcje alergiczne.

Wskazania - Otrivin Allergy, aerozol, 15 ml

Otrivin Allergy stosuje się do leczenia sezonowego (katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego nieżytu nosa, objawowego leczenia przeziębień, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego nieżytu nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia zatok, naczynioruchowego nieżytu nosa, niedrożność nosa po urazach jamy nosowej oraz jako leczenie wspomagające w zapaleniu ucha

środkowego i pielęgnacji przed- i pooperacyjnej w chirurgii nosa.

Przeciwwskazania - Otrivin Allergy, aerozol, 15 ml

-nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,

-zanikowy nieżyt nosa,

-aktualnie trwające lub zakończone w ciągu 14 dni leczenie inhibitorami monoaminooksydaz.

Przeciwwskazania - Otrivin Allergy, aerozol, 15 ml

Rzadko łagodne i przemijające objawy w miejscu podania: uczucie pieczenia lub suchość błony śluzowej nosa.

Uwagi

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem [Cała prawda o alergii](#)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.