

Otrivin, krople, 0,05% 10 ml



Nasza cena: 19,36 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,05%
Opakowanie	10ml
Postać	KROPLE
Producent	Novartis Consumer Health Sa
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Otrivin 0,05% jest miejscowo działającym lekiem, który poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny.

Dawkowanie - Otrivin, krople, 0,05% 10 ml

Otrivin 0,05% należy stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat (pod nadzorem dorosłych):

1 lub 2 krople roztworu Otrivin 0,05% do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10godzin); nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego tworu nosowego na dobę.

Leku Otrivin 0,05% nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.

Sposób stosowania:

- Oczyszczyć nos
- Odkręcić zakrętkę zawierającą kroplomierz
- Przechylić głowę do tyłu
- Wpuścić krople do obu otworów nosowych i przez jakiś czas trzymać odchyloną głowę, aby krople rozprzestrzeniły się po całej jamie nosowej.
- Po użyciu zakręcić butelkę.

Składniki - Otrivin, krople, 0,05% 10 ml

Substancja czynna: ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 0,5mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypomeloza 4000, woda oczyszczona.

Działania

Pacjentom z uczuciem zatkanego nosa, ułatwia oddychanie przez nos. Specjalny skład leku (substancje wykazujące działanie nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa. Działanie leku Otrivin 0,05% rozpoczyna się w ciągu kilku minut i trwa do dziesięciu godzin.

Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych.

Wskazania - Otrivin, krople, 0,05% 10 ml

Preparat stosowany w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występujący w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy noso-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin 0,05% ułatwia również wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Przeciwwskazania - Otrivin, krople, 0,05% 10 ml

Nie należy stosować leku Otrivin 0,05%:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazolinę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Otrivin 0,05%.

- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej.

Przeciwwskazania - Otrivin, krople, 0,05% 10 ml

Jak każdy lek, Otrivin 0,05% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: pieczenie w miejscu podania, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: uogólniona reakcja alergiczna, przemijające zaburzenia widzenia, niemiara lub przyspieszona czynność serca.

Uwagi

Nie należy stosować leku Otrivin 0,05% w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek Otrivin 0,05% można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Otrivin 0,05% stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30oC.

Więcej na temat alergii dowiedzą się Państwo z artykułu "Jesienne alergie."

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.