

## Ovulomed Max saszetki 4g x 30



Nasza cena: 70,80 zł

### Opis słownikowy

Producent	Kadefarm Sp Z O.o. Polska [PI]
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

#### Opis

Wspomaga terapię dla kobiet z zespołem policystycznych jajników. Poprawa funkcji metabolicznych, hormonalnych i rozrodczych.

#### Ovulomed max może być stosowany:

- pomocniczo w celu regulacji cykli miesięczkowych i w przypadku braku miesiączek
- u kobiet z zaburzeniami owulacji
- u kobiet z podwyższonym poziomem androgenów (hormon męski odpowiadający np. za nadmierne owłosienie i zmiany trądzikowe)
- w przypadkach insulinooporności

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest złożonym zaburzeniem hormonalnym u kobiet i pojawia się najczęściej we wczesnym okresie dojrzewania. Może wystąpić również dopiero około 20-25 roku życia. PCOS dotyczy 5-10% kobiet w wieku rozrodczym i stanowi aż 70% wszystkich przyczyn braku owulacji u kobiet z niepłodnością.

#### Najczęstsze objawy PCOS:

- nieregularne miesiączki lub ich brak,
- problemy z utrzymaniem wagi prowadzące do otyłości,
- problemy skórne: trądzik, przebarwienia i włókniaki, łojotok, łysienie, nadmierne owłosienie wynikające z wysokiego stężenia androgenów (męskich hormonów) we krwi,
- specyficzny obraz USG jajników (włóknienie wnętrza jajnika z peryferyjnie ułożonymi małymi pęcherzykami o średnicy nieprzekraczającej 8 mm).

W wyniku zaburzeń w wydzielaniu hormonów, u większości kobiet z zespołem PCOS występują cykle bezowulacyjne i niepłodność. Substancje aktywne zawarte w Ovulomed max wspomagają odzyskanie równowagi hormonalnej i prawidłowych funkcji rozrodczych.

#### Dawkowanie:

1 saszetka dziennie. Zawartość rozpuścić w 1 szklance wody.

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.  
Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.