

# Ozzion 20 mg 28 tabletek

Nasza cena: 3,80 zł

## Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	ZENTIVA K.S. CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PANTOPRAZOLUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Lek dostępny tylko i wyłącznie na receptę. Przepisywany jest przez lekarza w celu leczenia takich dolegliwości jak:

Dawka 20 mg. Dorośli i młodzież 12 lat i powyżej: leczenie choroby refluksowej z objawami. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli: zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez stosowanie niselektywnych NLPZ u pacjentów z grup ryzyka, wymagających długotrwałego leczenia NLPZ.

### Dawkowanie:

Nie jest zalecane stosowanie produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby nie należy przekraczać dawki 20 mg pantoprazolu/dobę.

### Działanie:

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który wstrzymuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzne blokowanie pompy protonowej w komórkach okładzinowych. W kwaśnym środowisku, w świetle kanalików komórek okładzinowych, pantoprazol jest przekształcany do postaci czynnej i hamuje aktywność H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku.

### Skład:

1 tabletkę dojelitową zawiera 20 mg pantoprazolu (co odpowiada 22,575 mg półtorawodnej soli sodowej pantoprazolu).

### **Przeciwwskazania:**

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi. Ekspozycja układowa do 240 mg po podaniu dożylnym w ciągu 2 minut była dobrze tolerowana. Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie. W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, nie ma specyficznych zaleceń dotyczących leczenia, poza leczeniem objawowym i wspomagającym.

### **Działania niepożądane:**

Działania niepożądane mogą wystąpić u około 5% pacjentów. Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą biegunka i ból głowy, występujące u około 1% pacjentów. Nie dla wszystkich działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu możliwe jest określenie częstości występowania według powyższych kategorii, dlatego takie przypadki określono jako częstość „nieznana”. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) agranulocytoza; (bardzo rzadko) trombocytopenia, leukopenia, pancytopenia.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.