

Pabialgin Neo, tabletki, 20 szt.



Nasza cena: 13,07 zł

Opis słownikowy

Producent	Polfa Pabianice
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

PABIALGIN NEO to preparat, który m.in. dzięki zawartości paracetamolu wykazuje właściwości łagodzące dolegliwości bólowe i obniżające gorączkę. Stymuluje ośrodkowy układ nerwowy znosząc uczucie zmęczenia.

Dawkowanie - Pabialgin Neo, tabletki, 20 szt.

- preparat przeznaczony do stosowania doustnego
- w przypadku osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia zaleca się doraźnie stosowanie 1-2 tabl. x 3-4/24h, przy przewlekłych bólach stosować 1 tabl. co 4-6h.

Składniki - Pabialgin Neo, tabletki, 20 szt.

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i kofeina.
pozostałe składniki: celuloza mikrokryształiczna, skrobia ziemniaczana, alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobia sodowa, talk, magnezu stearynian. 1 tabletki zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Działania

Lek zaliczany jest do szerokiej grupy złożonych preparatów przeznaczonych do podawania doustnego w postaci tabletek. Zawiera paracetamol, który wykazuje właściwości łagodzące dolegliwości bólowe i zmniejszające podwyższoną ciepłotę ciała. Kofeina intensyfikuje właściwości przeciwbólowe paracetamolu oraz pobudza ośrodkowy układ nerwowy znosząc uczucie zmęczenia. Preparat łagodzi ból już po 0,5-2h od zastosowania i działa nawet do 6h. Obniża ciepłotę ciała już po 2-3h od przyjęcia leku.

Wskazania - Pabialgin Neo, tabletki, 20 szt.

Preparat zalecany jest w przypadku występowania dolegliwości bólowych oraz podwyższonej ciepłoty ciała.

Przeciwwskazania - Pabialgin Neo, tabletki, 20 szt.

- uczulenie na składniki preparatu
- schorzenia wątroby/nerek
- nadciśnienie tętnicze
- deficyt dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,

- cukrzyca
- zaburzenia rytmu serca
- alkoholizm
- zespół lękowy
- ciąża

Uwagi

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.