

## Panadol Sprint, 12 tabletek



Nasza cena: 5,26 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	Tabletki
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

### Opis produktu

#### Opis

### Panadol Sprint, 12 tabletek

Panadol Sprint to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

#### Wskazania

Panadol Sprint to lek zawierający 500 mg paracetamolu w 1 tabletkce.

Lek działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo w przypadku:

- bólu głowy,
- migreny,
- bólu napięciowego,
- bólu zębów,
- nerwobóli,
- bólu kręgosłupa,
- bóli kostnych, stawowych i mięśniowych,
- bolesnego miesiączkowania,
- bólu gardła,
- bólu w czasie przeziębienia i stanów grypopodobnych,
- w objawowym leczeniu bólu w przebiegu łagodnego zapalenia stawów.

#### Skład

1 tabletkka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Substancje pomocnicze: Skrobia żelowana, Wapnia węglan, Kwas alginowy, Krospowidon Typ A , Powidon K-25, Magnezu stearynian, Krzemionka koloidalna bezwodna, Woda oczyszczona.

Otoczka: Opadry White YS-1-7003 o składzie: Tytanu dwutlenek (E 171), Hypromeloza 2910, 3cp, Hypromeloza 2910, 6cp, Makrogol 400, Polisorbat 80, Wosk Carnauba, Woda oczyszczona.

## Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg): doustnie 1-2 tabletki ( 500 mg-1000 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek).

Dzieci w wieku 6-11 lat: doustnie ½ - 1 tabletki (250 mg -500 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu: 60 mg/kg masy ciała/24 godziny podawane w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**