

# Panaprex 0,5 g, 50 tabletek powlekanych



Nasza cena: 12,91 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,5 G
Opakowanie	*50
Postać	TABL.POWL.
Producent	OLIMP LABORATORIES POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

## Opis produktu

### Opis

## Panaprex 0,5 g, 50 tabletek powlekanych

Panaprex to lek przeciwbólowy oraz przeciwgorączkowy. Produkt wskazany w leczeniu gorączki (w przeziębieniu, grypie) oraz w objawowym leczeniu bólu różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Lek wykazuje działanie przeciwbólowe w leczeniu bólów takich jak: bóle głowy, migrena, bóle kości i stawów, bóle mięśni, bóle pleców, bóle zębów, bóle pooperacyjne, bolesne miesiączkowanie, ból gardła.

### Wskazania

- Leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego m.in.: bóle głowy, migrena, bóle kości i stawów, bóle mięśni, bóle pleców, bóle zębów, bóle pooperacyjne, bolesne miesiączkowanie, ból gardła.
- Leczenie gorączki m.in. w przebiegu przeziębienia i grypy.

### Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) rdzeń tabletki: celuloza mikrokrytaliczna, powidon K90, woda oczyszczona 8, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa, sodu stearylofumarat. Otoczka opadry 200 White: silkohol poliwinylowy tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) sodu węglan.

### Dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg):

Doustnie, 1 do 2 tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 4 g (8 tabletek).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 – 50 kg):  
Doustnie, 1 tabletkę jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 6 razy na dobę.  
Maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 3 g (6 tabletek).

## Ważne

Stosować najniższą skuteczną dawkę w możliwie najkrótszym czasie.

Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej.

## Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Panaprex nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na moc produktu i postać farmaceutyczną.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**