Pangrol 10 000, kapsułki, 20 szt.

Nasza cena: 20,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	KAPS.
Producent	BERLIN CHEMIE AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PANCREATINUM

Opis produktu

Opis

Pangrol 10 000 zawiera enzymy trawienne trzustki (enzymy trzustkowe).

Dawkowanie - Pangrol 10 000, kapsułki, 20 szt.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Dawkowanie - Pangrol 10 000, kapsułki, 20 szt. leku Pangrol 10000 lekarz ustala indywidualnie, w zależności od stopnia niewydolności trzustki pacjenta. Najczęściej zaleca się przyjmowanie 2-4 kapsułek leku w czasie posiłku.
W zależności od rodzaju posiłku oraz nasilenia zaburzeń trawienia, wymagana dawka leku może być znacznie większa. Nie należy stosować dawki większej niż 10 000 j.Ph.Eur./kg mc. lipazy na dobę i 6 000 j.Ph.Eur./kg mc. na posiłek.
Kapsułki należy połykać w całości w trakcie posiłku popijając dużą ilością wody.
Pacjenci, którzy nie są w stanie połknąć kapsułki, mogą wysypać jej zawartość do szklanki z niewielką ilością płynu i natychmiast po wymieszaniu zażyć bez rozgryzania czy żucia, a następnie popić szklanką wody.

Składniki - Pangrol 10 000, kapsułki, 20 szt.

1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera:
Substancja czynna:
minitabletki:
Pankreatyna o aktywności:
Lipazy 10 000 j. Ph. Eur.
Amylazy 9 000 j. Ph. Eur.
Proteaz 500 j .Ph.Eur.

Substancje pomocnicze:
minitabletki:

- Kroskarmeloza sodowa
- Celuloza mikrokrystaliczna
- Olej rycynowy, utwardzany
- Krzemu dwutlenek bezwodny koloidalny
- Magnezu stearynian
- 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C
- Trietylu cytrynian
- 30% emulsja simetikonu
- Talk

Kapsułka:
- Żelatyna
- Żelaza tlenek czerwony E172
- Żółcień chinolinowa E104
- Żelaza tlenek żółty E172
- Indygotyna E132
- Tytanu dwutlenek E171

Wskazania - Pangrol 10 000, kapsułki, 20 szt.

Zaburzenia zewnątrzwydzielniczej czynności trzustki z towarzyszącą niestrawnością w następujących stanach:
- Przewlekłe zapalenie trzustki
- Stany po resekcji trzustki lub jej części
- Stany po resekcji żołądka
- Mukowiscydoza
- Zwężenie przewodu trzustkowego spowodowanego chorobą nowotworową np.: trzustki lub dróg żółciowych

Przeciwwskazania - Pangrol 10 000, kapsułki, 20 szt.

- Pacjenci z nadwrażliwością na wieprzowinę (alergia na wieprzowinę) lub inny składnik leku Pangrol 10 000.
- Pacjenci z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

Przeciwwskazania - Pangrol 10 000, kapsułki, 20 szt.

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać zażywanie leku Pangrol 10 000 i jeżeli jest to możliwe, zgłosić się do lekarza.
W pojedynczych przypadkach, po przyjęciu sproszkowanej trzustki, opisywano reakcje alergiczne typu natychmiastowego, takie jak: wysypka skórna, kichanie, łzawienie oczu, skurcz oskrzeli, reakcje alergiczne ze strony przewodu pokarmowego. U pacjentów z charakterystycznymi zaburzeniami czynności trzustki (mukowiscydoza), w pojedynczych przypadkach po przyjęciu dużych dawek sproszkowanej trzustki, opisywano występowanie zwężeń dolnych fragmentów jelita (w obszarze krętniczo- kątniczym i okrężnicy wstępującej).

Uwagi

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa ciążę, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią powinna poinformować o tym swojego lekarza, zanim zastosuje lek Pangrol 10 000.
Lek Pangrol 10 000 zawiera czynne enzymy, które w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i przyjmować lek wyłącznie w sposób zgodny z opisanym.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.