


Papilocare żel dopochwowy 7 aplikatorów po 5 ml



Nasza cena: 75,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	7 APLIK.A 5ML
Postać	ZEL
Producent	GEDEON RICHTER LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Papilocare żel dopochwowy 7 aplikatorów po 5 ml

Żel przyspieszający reepitalizację (odbudowę nabłonka) w obrębie strefy przekształceń nabłonka szyjki macicy stosowany w pro laktyce i wspomaganiu leczenia zmian wywołanych przez wirus HPV

Zastosowanie:

Wyrób medyczny wspomagający:

- Procesy kontroli i reepitalizacji (odbudowy) strefy przekształceń nabłonkowych szyjki macicy w celu zapobiegania ryzyku występowania śródnabłonkowych zmian małego stopnia (LSIL) wywołanych przez wirus HPV.
- Leczenie zmian śródnabłonkowych wywołanych przez wirus HPV.
- Naprawę i reepitalizację uszkodzeń błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.
- Leczenie suchości błony śluzowej pochwy.
- Przywrócenie równowagi mikrobiologicznej pochwy.
- Poprawę ogólnego stanu pochwy.
- Stworzenie warunków do szybkiego gojenia się uszkodzeń na skutek drapania spowodowanego świądem i pieczeniem.

W przypadku uszkodzeń, które powodują świąd i/lub pieczenie tworzy warstwę ochronną, która szybko łagodzi dolegliwości, tworząc odpowiednie warunki przyspieszające naturalny proces gojenia.

Dawkowanie:

Aplikator służy do jednorazowego użycia, jego zawartość należy stosować dopochwowo, najlepiej wieczorem przed snem. Ścisnąć opakowanie tak, aby opróżnić zawartość aplikatora i delikatnie wyjąć. Nie podmywać się. Wyrzucić jednorazowy aplikator. Zaleca się stosowanie raz dziennie przez 21 dni, a następnie co drugi dzień, w zależności od zaleceń lekarza.

Działanie:

Żel dopochwowy, którego właściwości umożliwiają:

- Stworzenie warstwy ochronnej w stre e przekształceń nabłonkowych szyjki macicy w celu zapobiegania ryzyku integracji wirusa HPV.
- Przyspieszenie procesu gojenia, jeśli stosowany jest we wspomaganie leczenia zmian śródnabłonkowych wywołanych przez wirus HPV w obrębie błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.

Główne działanie składników żelu dopochwowego Papilocare:

- Niosomy kwasu hialuronowego: ich głównym działaniem jest nawilżenie powierzchniowe tkanek, nadanie im elastyczności.
- Niosomy β -glukanu: dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym umożliwiają utrzymanie naturalnej struktury i funkcji skóry oraz błon śluzowych.
- Fitosomy wąkrotki azjatyckiej (Centella Asiatica): odbudowują błonę śluzową.
- BioEcolia: oligosacharyd, który stymuluje namnażanie korzystnej ory bakteryjnej i przywraca równowagę mikrobiologiczną pochwy.
- Aloe (Aloe Vera): działa nawilżająco, wspomaga reepitalizację (odbudowę nabłonka) i regenerację pochwy.
- Wrośniak różnobarwny (Coriolus Versicolor): wspomaga reepitalizację zmian śródnabłonkowych i mikrouszkodzeń w obrębie szyjki macicy i pochwy.
- Wyciąg z miodły indyjskiej (Neem): działanie emoliencyjne (natłuszcza i nawilża nabłonek), które przyspiesza naturalny proces gojenia oraz łagodzi podrażnienia i świąd.

Ostrzeżenia:

Nie należy stosować w przypadku rozpoznanej nadwrażliwości na którykolwiek składnik. Jeśli po zastosowaniu występują dolegliwości związane z użyciem produktu, należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem. W przypadku ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.