

Paracetamol Accord 500mg x 100

Nasza cena: 17,41 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 MG
Opakowanie	*100
Postać	Tabletki
Producent	Accord Healthcare Ltd Wielka Brytania [Gb]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Tabletki musujące Paracetamol Accord zawierają paracetamol, który jest lekiem łagodzącym ból (lek przeciwbólowy) i obniżającym temperaturę ciała w gorączce (lek przeciwgorączkowy). Stosowanie tabletek zaleca się w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu i/lub gorączki.

Jak stosować:

Produkt leczniczy Paracetamol Accord należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Paracetamol Accord są to tabletki musujące do podawania doustnego. Tabletkę należy rozpuścić w szklance wody, tak przygotowany roztwór należy wypić od razu po przygotowaniu.

W przypadku wątpliwości dotyczących właściwej dawki leku Paracetamol Accord należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt leczniczy Paracetamol Accord jest przeznaczony tylko dla dorosłych oraz młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

Dorośli i młodzież o masie ciała > 50 kg :

Przyjmować jedną tabletkę (1000 mg) co 4-6 godzin, nie przekraczając 3 tabletek (3000mg) Paracetamol Accord na dobę.

Zalecana maksymalna dawka dobową:

Maksymalna dawka dobową leku Paracetamol Accord nie może przekroczyć 3000mg (3 tabletki) Maksymalna dawka pojedyncza to 1000mg (1 tabletkę musującą).

Minimalny odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 4-6 godzin

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Skład:

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletkę musująca zawiera 1000 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol E420, sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan, Powidon K25, symetykon-emulsja (30%), sodu dokuzynian, sacharyna sodowa, Makrogol 6000, monosodu glicynowęglan, sodu benzoosan.

Skład emulsji Symetykon (30%): woda, polidimetylosiloksan, glikolu polietylenowego stearynian, glikol polietylenowy, mono- i di- glicerydy o długości łańcucha C14-18, glikolu polietylenowego distearynian, glikolu polietylenowego palmitynian, oktametylcyclotetrasiloksan.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.