

Paracetamol Aurovitas 500 mg, 10 tabletek

Nasza cena: 1,92 zł



Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Paracetamol Aurovitas, Paracetamolum, 500 mg, 10 tabletek

Każda tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu.

Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i/lub gorączki.

Dawkowanie: wyłącznie doustnie. Dorośli, osoby starsze i dzieci w wieku 16 lat i starsze (o masie ciała >55 kg): jednorazowa dawka to 500 mg do 1000 mg, oraz do 3000 mg/dobę. Maks. dawka dobową paracetamolu nie może być >3000 mg. Dzieci w wieku od 10 do 15 lat (o masie ciała 40 – 55 kg): jednorazowa dawka to 500 mg, oraz do 2000 mg/dobę. Dawka dobową paracetamolu nie może być >2000 mg.

Sposób użycia: Paracetamol w tabletkach nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 10 lat. Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana z powodu ryzyka poważnego uszkodzenia wątroby. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, lub objawy nasiliły się lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Przyjmowanie paracetamolu z jedzeniem i pić nie wpływa na skuteczność leku.

Sposób podania: Tabletki należy połykać popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciąża: Duża ilość danych dot. kobiet w ciąży nie wskazuje ani na deformację, ani na toksyczność dla płodu lub noworodka. Badania epidemiologiczne dot. rozwoju neurologicznego dzieci narażonych na paracetamol w macicy nie przynoszą rozstrzygających wyników. Jeśli jest to klinicznie konieczne, paracetamol można stosować w okresie ciąży, jednak należy go stosować w najniższej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas i przy najmniejszej możliwej częstotliwości.

Karmienie: Po podaniu doustnym niewielkie ilości paracetamolu są wydalane z mlekiem matki, jednak nie w ilości znaczącej klinicznie. Do chwili obecnej nie są znane żadne działania niepożądane lub skutki uboczne podczas karmienia. Lek można podawać podczas laktacji w dawkach terapeutycznych.

Paracetamol nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Opłatność: Produkt leczniczy pełnopłatny.

Podmiot Odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lokal 27, 01-909 Warszawa, Polska Szczegółowe informacje znajdują się w ChPL (data ostatniej rewizji dokumentu: maj 2019). Wszelkich informacji udziela: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lokal 27, 01-909 Warszawa, tel. +48 22 299 71 60

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.