

Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki, 20 szt.



Nasza cena: 4,80 zł

Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	Biofarm Sp.z O.o.poznań
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Paracetamol Biofarm jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie.

Dawkowanie - Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki, 20 szt.

Dorośli i młodzież:

Maksymalna dawka dobową dla osób dorosłych nie powinna przekroczyć 4 g (8 tabletek). Lek ten u dorosłych zwykle stosuje się jednorazowo w ilości od 1 do 2 tabletek. W utrzymującym się bólu przyjmuje się od 2 do 4 razy na dobę od 1 do 2 tabletek, nie częściej niż co 4 godziny. W bólach nowotworowych - 10 mg /kg m.c./ dawkę co 4 godziny, zwykle w połączeniu z lekami przeciwbólowymi o innym mechanizmie działania.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Doustnie podaje się połowę dawki przewidzianej dla dorosłych z zachowaniem większych odstępów czasu pomiędzy poszczególnymi dawkami.

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat:

Dzieciom w wieku od 3 miesięcy do 6 lat paracetamol podawać można stosując go w ilości 10 mg/ kg m.c./ dawkę w odstępach nie mniejszych niż co 6 godzin.

Składniki - Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki, 20 szt.

Paracetamol 500 mg oraz substancje pomocnicze.

Inne składniki leku to : skrobia żelowana, krospowidon, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Działania

Paracetamol Biofarm jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie.

Wskazania - Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki, 20 szt.

Paracetamol stosuje się w bólach różnego pochodzenia i o różnym natężeniu. Szczególnie zalecany jest w bólach głowy, migrenach, w bólach reumatycznych, stawowych, mięśniowych i kostnych, w bólach kręgosłupa, nerwobólach, w bólu zębów i w bólach

menstruacyjnych. Paracetamol wskazany jest jako lek przeciwgorączkowy w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Szczególnie przydatny jest w przypadku nadwrażliwości na salicylany.

Przeciwwskazania - Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki, 20 szt.

Nie stosować leku Paracetamol Biofarm:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli pacjent cierpi na chorobę alkoholową,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Przeciwwskazania - Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki, 20 szt.

Paracetamol stosowany w zalecanych dawkach terapeutycznych, zwykle nie wywiera działań niepożądanych.

Działania niepożądane mogące wystąpić po przyjęciu paracetamolu należą do rzadkich (występujących mniej niż u 1 osoby na 1000) i są to:

- złe samopoczucie,
 - niedociśnienie,
 - podwyższone stężenie enzymów wątrobowych,
- i bardzo rzadkich (występujących u mniej niż jednej osoby na 10 000 łącznie z pojedynczymi przypadkami):
- reakcje nadwrażliwości
 - zmiany w obrazie morfologicznym (trombocytopenia, leukopenia, neutropenia).

Uwagi

Zachować szczególną ostrożność:

- jeśli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające w swoim składzie paracetamol,
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby i nerek,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, a w szczególności o wymienionych poniżej: metoklopramid, domperidon, cholestyramina, doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn, leki nasenne, przeciepadaczkowe, salicylamid, kofeina, inhibitory MAO, NLPZ.

Ciąża i karmienie piersią:

Badania epidemiologiczne nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol jest wydzielany do mleka matki w ilościach nie mających znaczenia klinicznego.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.