

Paracetamol Hasco, czopki, 125mg, 10 szt.



Nasza cena: 5,11 zł

Opis słownikowy

Dawka	125MG
Opakowanie	*10
Postać	CZOPKI
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w bólach różnego pochodzenia, stanach gorączkowych.

Dawkowanie - Paracetamol Hasco, czopki, 125mg, 10 szt.

Czopki Paracetamol Hasco stosuje się doodbytniczo. U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. U dzieci dawkę ustala się wg masy ciała (przeciętna jednorazowa dawka wynosi 10-15mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej:

3 miesiące - 1rok - 80 mg

2-3 lata - 125 mg

4-6 lat - 125 mg do 250 mg

7-8 lat - 250 mg

9-10 lat 250 mg do 500 mg

11-12 lat - 500 mg.

Pojedynczą dawkę można podawać 4 razy na dobę nie częściej niż co 4 godziny.

Składniki - Paracetamol Hasco, czopki, 125mg, 10 szt.

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: paracetamol 125 mg.

- substancję pomocniczą: tłuszcz stały (Witepsol S58).

Działania

Paracetamol Hasco jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 godz. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6-8 godz.

Wskazania - Paracetamol Hasco, czopki, 125mg, 10 szt.

Wskazania - Paracetamol Hasco, czopki, 125mg, 10 szt. mi do podawania paracetamolu są bóle mięśni, stawów, kości, zębów, nerwobóle, ból pleców, barku i głowy, ból miesiączkowy oraz stany gorączkowe, a także ból po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

Przeciwwskazania - Paracetamol Hasco, czopki, 125mg, 10 szt.

Nie należy stosować leku Paracetamol HASCO, jeśli występuje nadwrażliwość na paracetamol, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność nerek.

Przeciwwskazania - Paracetamol Hasco, czopki, 125mg, 10 szt.

W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

- bardzo rzadko (< 1/10 000) : agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.

Zaburzenia układu oddechowego

- rzadko (>1/10 000 do <1/1000) : obrzęk krtani.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

- bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.

Zaburzenia układu immunologicznego

- rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka).

- bardzo rzadko: uczulenie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Uwagi

Bez zalecenia lekarza nie stosować:

- przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci,

- w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni,

- w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.

- W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych, nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu.

U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe czy też ryfampicyna, a także równoczesne picie alkoholu, może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.