

PARACETAMOL HASCO FORTE 240mg/5ml, zawiesina doustna, 85 ml



Nasza cena: 19,83 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,24 G/5ML
Opakowanie	85 ML
Postać	ZAW.DOUST.
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

PARACETAMOL HASCO FORTE 240mg/5ml, zawiesina doustna, 85 ml

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy z paracetamolem. Produkt leczniczy Paracetamol Hasco Forte 240 mg/5 ml jest wskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w leczeniu gorączki, bólu różnego pochodzenia oraz odczynu poszczepiennego. Lek stosowany w zalecanych dawkach dobowych jest dobrze tolerowany.

Dawkowanie

Dzieci:

Zwykle 10–15 mg/kg mc. lub w zależności od wieku:

- 0.–3. mż. (do 4 kg mc.) 60 mg
- 4.–8. mż. (do 7 kg mc.) 96 mg
- 9.–11. mż. (do 8 kg mc.) 120 mg
- 1–2 lat (do 10,5 kg mc.) 156 mg
- 2–3 lat (do 13 kg mc.) 192 mg
- 4–5 lat (do 18,5 kg mc.) 288 mg
- 6–8 lat (do 24 kg mc.) 360 mg
- 9–10 lat (do 32 kg mc.) 480 mg
- 11–12 lat (do 45,6 kg mc.) 684 mg.

Dawkę można powtarzać do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4–6 godzin.

Ważne

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami, które zawierają paracetamol, istnieje bowiem duże ryzyko przedawkowania. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Należy zachować ostrożność w przypadku osób z niewydolnością nerek i wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób niedożywionych. Należy zachować ostrożność u osób w stanach obniżonego poziomu glutationu. Paracetamol może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Należy zachować ostrożność u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. U osób z astmą, uczulonych na salicylany może wystąpić uczulenie na paracetamol. Stosowanie paracetamolu może stanowić czynnik ryzyka rozwoju astmy i chorób alergicznych u dzieci. Podczas stosowania leku nie spożywać alkoholu i nie stosować z ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi. Stosowanie u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią: stosowanie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne. Lek zawiera sacharozę – 3,7g sacharozy w 5ml zawiesiny – jest to informacja istotna dla osób chorych na cukrzycę, osoby z nietolerancją niektórych cukrów powinny się skonsultować z lekarzem przed zastosowaniem leku. Lek zawiera pirosiarczyn sodu – składnik ten może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Lek zawiera kwas benzoowy – 7,059mg soli kwasu benzoowego w 5ml zawiesiny – składnik ten może zwiększać ryzyko żółtaczk (zażółcenie skóry i białówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia). Lek zawiera sól – mniej niż 1mmol (23mg) sodu na 5ml zawiesiny, czyli uznaje się go za „wolny od sodu”. Lek zawiera d-limonen. Lek zawiera glikol propylenowy – 10,575mg glikolu propylenowego w 5ml zawiesiny. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek ma być podawany dzieciom poniżej 4. tygodnia życia, szczególnie w przypadku, gdy dziecko przyjmuje inne produkty lecznicze zawierające glikol propylenowy lub alkohol.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny zawiera 240 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sodu benzoian (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy naturalny AR 2143 (zawiera naturalne substancje aromatyczne, w tym d-limonen oraz glikol propylenowy), woda oczyszczona

Producent

HASCO-LEK

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.