

PARACETAMOL POLFA-ŁÓDŹ, 500 mg, 20 tabletek

Nasza cena: 4,27 zł



Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	POLFA ŁÓDŹ S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Paracetamol 500 mg Polfa Łódź, 10 tabletek

Wskazania

- bóle głowy i migrena
- bóle stawowe i mięśniowe,
- bóle miesiączkowe
- bóle po urazach chirurgicznych oraz stomatologicznych
- gorączka w stanach grypopodobnych i przeziębieniach

Właściwości

Działa kojąco na pierwotne i/ lub wtórne bóle głowy oraz łagodzi napięciowe bóle głowy.

Łagodzi objawy bólu spowodowane czynnikami wywołującymi bóle głowy, między innymi: niedobór lub brak snu, stres, stany chorobowe, urazy głowy czy szyi, a także nadmierny hałas i brak świeżego powietrza.

Leczenie bólów różnego pochodzenia, między innymi: bólów głowy (także migrenowych), stawowych, mięśniowych, miesiączkowych oraz występujących po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych, gorączki np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat - doustnie 1 lub 2 tabletki co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

Lek podaje się doustnie.

Paracetamolu nie należy nadużywać i przyjmować w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 3 dni bez konsultacji lekarskiej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, choroba alkoholowa.

Skład

Jedna tabletką zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (170 mg/tabletkę).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.