

Paramax Comp tabletki 0,5g + 0,065g x 20



Nasza cena: 7,72 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5G+0,065G
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	Vitalbans Oy
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Paramax Comp jest lekiem uśmierzającym ból i obniżającym gorączkę (lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy). Paramax Comp zawiera 2 substancje aktywne, paracetamol i kofeinę. Paracetamol łagodzi ból i obniża gorączkę, a kofeina wzmacnia jego działanie przeciwbólowe.

Paramax Comp stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ból głowy, zębów, bóle menstruacyjne i/lub gorączki.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania doustnego w krótkim okresie czasu.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

Zwykle stosowana dawka to 1-2 tabletki do 3 razy na dobę lub w razie potrzeby.

Dawka 1-2-tabletkowa nie może być przyjmowana częściej niż co 6 godzin. Właściwy odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej dawki dobowej.

Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej, 6 tabletek, w ciągu 24 godzin.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku:

Jak dorośli.

Stosowanie u dzieci:

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paramax Comp:

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i zatrucia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy przedawkowania to błądź, nudności, wymioty, jadłowstręt, ból brzucha, drżenie, nerwowość, pobudzenie, zwiększone wydalanie moczu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, tachykardia lub arytmia serca.

Pominięcie zastosowania leku Paramax Comp:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie według przyjętego schematu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.