

# PECTOSOL, koncentrat do sporządzania zawiesiny doustnej, 40 g

cena: 10,57 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	40g
Postać	koncentrat do sporządzania roztworu doustnego
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HERBAL PRAEPARATIO

## Opis produktu

### OPIS

**PECTOSOL to tradycyjny lek roślinny** w postaci koncentratu do sporządzania roztworu doustnego zawierający substancje czynne: *Extractum liquidum ex: Thymi herba, Lichen islandicus, Hyssopi herba, Saponariae radice.*

### SKŁAD

100 g leku zawiera 90 g płynnego wyciągu (1:3) z: *Thymus vulgaris* L. lub *Thymus zygis* L., herba (ziele tymianku) / *Cetraria islandica* (L.) *Acharius* s.l., *thallus* (porost islandzki) / *Hyssopus officinalis* L., herba (ziele hyzopu) / *Saponaria officinalis* L., *radix* (korzeń mydlnicy) (18/7/3/2).

Ekstrahent: etanol 70% (V/V).

Pozostały składnik to: glicerol.

Lek zawiera 57-63% (V/V) etanolu.

### DZIAŁANIE LEKU

Pectosol jest tradycyjnym lekiem roślinnym ułatwiającym odkrztuszenie zalegającej wydzieliny w przebiegu przeziębienia. Zawiera etanolowo-wodny wyciąg z: ziela tymianku, porostu islandzkiego, ziela hyzopu i korzenia mydlnicy. Jest przeznaczony do stosowania doustnego.

### DAWKOWANIE

**Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** 3 razy na dobę pić po 1 łyżeczce leku Pectosol (ok. 5 ml) rozcieńczonego w ½ szklanki (ok. 125 ml) wody.

### WSKAZANIA

Tradycyjny lek roślinny stosowany w:

- stanach zapalnych górnych dróg oddechowych,

- utrudnionym odkrztuszaniu z zalegającą wydzieliną.

Wymienione wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

#### PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie stosować leku Pectosol

- Jeśli pacjent ma uczulenie na ziele tymianku, porost islandzki, ziele hyzopu, korzeń mydlnicy lub rośliny z rodziny Jasnowiątych (Lamiaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano reakcje nadwrażliwości (w tym jeden przypadek wstrząsu anafilaktycznego i jeden przypadek obrzęku Quinckego) i zaburzenia żołądka. Częstość nieznana.

Raportowano reakcje alergiczne, bóle brzucha i nudności.

W rzadkich przypadkach, podrażnienie żołądka

#### CIAŻA I KARMIEŃ PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN

Ilość alkoholu w tym leku może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, gdyż może on wpływać na ocenę sytuacji i szybkość reakcji. Nie zaleca się stosowania leku przed podróżą oraz w jej trakcie, ponieważ alkohol zawarty w leku może być wykryty w powietrzu wydychanym.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## To jest lek

Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania bądź etykietą. Nie stosuj w przypadku przeciwwskazań. Nie przekraczaj maksymalnej dawki. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania informacji o możliwości zastosowania zamienników skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ulotka dla pacjenta oraz Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dostępne są na stronie [rejestrzy.ezdrowie.gov.pl](https://rejestrzy.ezdrowie.gov.pl)

