

# Pedicetamol, roztwór doustny, 100mg/ml, 60 ml



Nasza cena: 25,47 zł

## Opis słownikowy

Dawka	100MG/1ML
Opakowanie	60ml
Postać	ROZT.DOUST.
Producent	POLSKI LEK POLSKA
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

## Opis produktu

### Opis

Pedicetamol to:

- Łatwiejsze dawkowanie i lepsza akceptacja leku przez niemowlęta i małe dzieci dzięki 4 razy mniejszej objętości płynu,
- Precyzyjne dawkowanie dzięki dołączonym specjalnym dozownikom (kroplomierz i wyskalowana strzykawka)
- Bezpieczeństwo dzięki specjalnej zakrętce z systemem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem przez dziecko
- Malinowy smak

### Dawkowanie - Pedicetamol, roztwór doustny, 100mg/ml, 60 ml

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w ml roztworu doustnego.

Dawka 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin

Łatwy przelicznik: masa ciała x 0,15 = ilość leku Pedicetamol w ml, np.: 10 kg x 0,15 = 1,5 ml

Dawka 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny

Łatwy przelicznik: masa ciała x 0,10 = ilość leku Pedicetamol w ml, np.: 10 kg x 0,10 = 1,0 ml

Zalecana dobową dawką paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc./dobę, która podawana jest w 4 lub 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc.

co 4 godziny. Jeżeli przy zalecanym dawkowaniu co 6 godzin, pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, preparat może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku należy podawać dawkę 10 mg/kg mc.

### Składniki - Pedicetamol, roztwór doustny, 100mg/ml, 60 ml

1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu (10% stężenie)

## Wskazania - Pedicetamol, roztwór doustny, 100mg/ml, 60 ml

Dla dzieci w gorączce trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

## Uwagi

Lek wydawany bez recepty. Zalecana pojemność opakowania dla dzieci powyżej 3 lat

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**