

Pelafen Baby 6+ Smak owocowy kapsułki twist-off x 20



Nasza cena: 27,27 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Opakowanie | *20 |
| Postać | KAPS.TWIST-OFF |
| Producent | PHYTOPHARM KLĘKA S.A. POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Suplement diety |

Opis produktu

Opis

Pelafen Baby 6+ to specjalnie dobrany kompleks składników naturalnego pochodzenia – ekstrakt z kwiatostanu lipy, ekstrakt z owoców bzu czarnego, beta-glukany oraz witamina C i cynk zawarte w produkcie **Pelafen Baby 6 m+** dostarczają organizmowi składniki zalecane podczas przeziębienia i grypy:

- **lipa** wspiera prawidłowe funkcjonowanie gardła i strun głosowych, wspiera fizjologiczne wydzielanie potu, co jest korzystne w stanach przeziębieniowych.

- **Owoc bzu czarnego** wspomaga naturalne funkcje immunologiczne organizmu

- **Witamina C1 i cynk1** wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, co odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu organizmu w dobrej kondycji; w trakcie infekcji znacznie zwiększa się zapotrzebowanie organizmu na te składniki odżywcze.

- **Beta-glukany 1,3/1,6 D** to naturalne polisacharydy występujące w ścianach komórkowych mikroorganizmów.

Kontrolowany proces produkcji oraz wysoka jakość składników zapewniają odpowiednią jakość produktu.

Dawkowanie:

dzieci powyżej 6 miesiąca do 2 roku życia zawartość 1 kapsułki 2 razy dziennie, powyżej 2. roku życia zawartość 1 kapsułki 3 razy dziennie lub w każdym przypadku według wskazań lekarza.

Sposób użycia:

Końcówkę kapsułki należy ścisnąć, przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do pokarmu.

Uwaga:

Należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie połknęło otoczki kapsułki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.