

# Pelavo Multi 3+ Przeziębienie i Grypa 120ml



Nasza cena: 34,11 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	120 ml
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### Opis

**Pelavo Multi 3+ Przeziębienie i Grypa** to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w przeziębieniu i grypie zarówno przy pierwszych objawach infekcji, jak i w trakcie jej trwania.

#### Pelavo Multi 3+ zawiera:

- standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób łagodzi dolegliwości dróg oddechowych
- ekstrakt z lipy, który działa napotnie, pomagając utrzymać właściwą temperaturę ciała w trakcie przeziębienia i grypy.
- witaminę C, która dodatkowo wspomaga naturalne siły obronne organizmu

**Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej** zawiera szereg bioaktywnych substancji należących do grupy kumaryn, glikozydów, fenolokwasów, flawonoidów i proantocyjanidyn, a także kwasów tłuszczowych. Zawartość poszczególnych składników w ekstrakcie może być różna – zależnie od warunków atmosferycznych panujących na plantacjach pelargonii afrykańskiej. Dlatego tak ważna jest standaryzacja ekstraktu, która daje gwarancję, że w każdej partii produkcyjnej **Pelavo Multi 3+** jest taka sama zawartość substancji odpowiedzialnych za jego działanie. **Pelavo Multi 3+** zawiera wysokiej jakości standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej.

#### Sposób użycia:

Dzieci powyżej 3 roku życia: 2,5ml trzy razy dziennie. **Pelavo Multi 3+** zaleca się stosować podczas infekcji i 2 – 3 dni po jej ustąpieniu, jednak łącznie nie dłużej niż przez 14 dni. Do odmierzenia syropu można używać załączonej miarki.

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.