

Pelethrocine, 500 mg, tabletki, 30 szt



Nasza cena: 19,70 zł

Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Help S.a. Pharmaceuticals
Rejestracja	Bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w leczeniu objawów związanych z niewydolnością żylną kończyn dolnych.

Dawkowanie - Pelethrocine, 500 mg, tabletki, 30 szt

Zwykle stosuje się 2 tabletki na dobę (1 tabletko rano i 1 tabletko wieczorem) podczas posiłków.

Składniki - Pelethrocine, 500 mg, tabletki, 30 szt

Diosmina 500 mg, substancje pomocnicze: karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, magnezu stearynian, talk, wosk pszczeli, glicerol, hypromeloza 2190, macrogol 6000, laurylosiarczan sodu, żelaza tlenek żółty E172, żelaza tlenek czerwony W172, tytanu dwutlenek E171, magnezu stearynian.

Działania

Pelethrocine jest lekiem zawierającym zmikronizowaną diosminę. Substancja czynna leku wykazuje działanie ochronne na naczynia. Lek Pelethrocine podwyższa stan napięcia żylnego oraz zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność naczyń włosowatych, okołonaczyńniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu oraz zwiększając wytrzymałość naczyń.

Wskazania - Pelethrocine, 500 mg, tabletki, 30 szt

Leczeniu objawów związanych z niewydolnością żylną kończyn dolnych.

Przeciwwskazania - Pelethrocine, 500 mg, tabletki, 30 szt

Nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

Przeciwwskazania - Pelethrocine, 500 mg, tabletki, 30 szt

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania diosminy to:

- zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty;
- zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie;
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka.

W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie produktu leczniczego.

Uwagi

W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia: unikanie ekspozycji na słońce, unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, utrzymanie odpowiedniego ciężaru ciała, noszenie specjalnych pończoch.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek nie powinien być stosowany podczas 3 pierwszych miesięcy życia, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej. Nie badano czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, tak więc podczas karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".