

Perazin 25 mg 50 tabletek

Nasza cena: 5,16 zł

Opis słownikowy

Dawka	25MG
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PERAZINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu różnego rodzaju postaci schizofrenii oraz ostrych zaburzeń psychiatrycznych z towarzyszącymi objawami pobudzenia psychoruchowego, manii i urojeń.

Dawkowanie:

- zalecana dawka początkowa wynosi od 50 do 100 mg na dobę,
- jeżeli istnieje taka konieczność dawkę ta można stopniowo zwiększać do 300 a nawet 600 mg na dobę,
- maksymalna dawka jaka można podać pacjentowi może wynosić 800 mg na dobę w dawkach podzielonych,
- dawka podtrzymująca waha się na poziomie od 75 do 300 mg na dobę,
- nie zaleca się nagłych zmian dawkowania, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych,
- lek wykazuje maksymalne działanie po okresie od 1 do 3 tygodni leczenia.

Działanie:

- neuroleptyczne
- przeciwhistaminowe

- przeciwpsychotyczne
- hamuje wpływ na układ dopaminergiczny OUN.
- hamuje przekazywanie synaptyczne poprzez blokowanie receptorów postsynaptycznych
- hamuje uwalniania i wychwyty neuronalnego dopaminy.
- rozluźnia mięśnie szkieletowe

Skład:

1 tabletkę 25 mg zawiera 42,1 mg perazyny dimaleinianu, co odpowiada 25 mg perazyny.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub inne leki przeciwpsychotyczne,
- złośliwy zespół poneuroleptyczny w wywiadzie,
- ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego lub komórek krwi,
- stany śpiączkowe,
- ciąża i okres karmienia piersią,
- ostre zatrucia jednym z wymienionych środków: leki nasenne, opioidy, inne leki neuroleptyczne, leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, alkohol,
- guzy zależne od prolaktyny,
- ciężka niewydolność wątroby,
- stany depresyjne.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane mogą występować tylko u części pacjentów. U niektórych z nich mogą w ogóle się nie objawiać.

Najczęstsze działania niepożądane jakie występują podczas stosowania leku to:

- zmiana ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- obrzęk błony śluzowej nosa,
- zaparcia,
- trudności w oddawaniu moczu,
- przyrost masy ciała
- suchość błon śluzowych jamy ustnej,
- nasilone pragnienie,
- zaburzenia czynności seksualnych (np. zaburzenia erekcji, ejakulacji).

Informacje na temat innych działań niepożądanych zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Szczegółowych

informacji może udzielić również lekarz lub też farmaceuta.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.