

Periokin, żel stosowany w satanach zapalnych dziąseł, 30 ml



cena: 16,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Postać	ZEL
Producent	Kin
Rejestracja	Bez recepty

Opis produktu

Opis

Perio-Kin - żel stosowany w satanach zapalnych dziąseł.

Dawkowanie - Periokin, żel stosowany w satanach zapalnych dziąseł, 30 ml

Nanieść żel 2-3 razy dziennie, masując dziąsła za pomocą miękkiej szczoteczki lub pałeczki kosmetycznej. Ewentualnie, nanieść żel dokładnie na chore miejsce, jeśli stan dziąsła tego wymaga. Stosować po jedzeniu i przez co najmniej pół godziny nie zaleca się przyjmować napojów ani pokarmów. Najlepsze efekty uzyskuje się podczas stosowania na noc. Po użyciu nie płukać jamy ustnej. Nie połykać.

Składniki - Periokin, żel stosowany w satanach zapalnych dziąseł, 30 ml

Sorbitol, Aqua, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethylcellulose, Aroma, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Methylparaben, Methyl Salicylate, Menthol, Citric Acid, Eugenol, Limonene, Cinnamal.

Chlorhexidine Digluconate 0,2 g
Substancje pomocnicze do 100 g

Działania

Nanieść żel 2-3 razy dziennie, masując dziąsła za pomocą miękkiej szczoteczki lub pałeczki kosmetycznej. Ewentualnie, nanieść żel dokładnie na chore miejsce, jeśli stan dziąsła tego wymaga. Stosować po jedzeniu i przez co najmniej pół godziny nie zaleca się przyjmować napojów ani pokarmów. Najlepsze efekty uzyskuje się podczas stosowania na noc. Po użyciu nie płukać jamy ustnej. Nie połykać.

Wskazania - Periokin, żel stosowany w satanach zapalnych dziąseł, 30 ml

w chorobach przyzębia i w implantologii,
pomocniczo w zapobieganiu zapaleniom dziąseł,
w przypadku nadmiernego tworzenia się płytki bakteryjnej,
jako doustny środek antyseptyczny przed i po zabiegu chirurgicznym.

Przeciwwskazania - Periokin, żel stosowany w satanach zapalnych dziąseł, 30 ml

Nadwrażliwość na chloryhexydynę - reakcja występująca niezwykle rzadko.