

Perspi Block, 60 tabletek



Nasza cena: 25,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	AFLOPA - PABIANICE POLSKA
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Perspi Block, 60 tabletek

Hamuje nadmierne wydzielanie potu.

Dawkowanie - Perspi Block, 60 tabletek

Dorośli: 3 x 1 tabletki. Preparat zaleca się zażywać podczas lub po posiłku popijając wodą.

Składniki - Perspi Block, 60 tabletek

1 tabletki zawiera:

- Liście szałwii- 450mg
- Ziele skrzypu- 150mg
- Ziele pokrzywy- 400mg
- Ziele melisy- 175mg
- celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela pokrzywy, ekstrakt z ziela skrzypu, suchy wyciąg z ziela melisy, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,, dwutlenek tytanu, hydroksypropylometyloceluloza, żółcień chinolinowa żółcień pomarańczowa, wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Działania

Szałwia lekarska - korzystnie wpływa na proces regulacji wydzielania potu- wykazuje działanie przeciwpotne.

Skrzyp polny - zawartość flawonoidów w surowcu powoduje nieznaczne zwiększenie objętości wydalanego moczu, co zmniejsza ilość płynów wydalanych przez skórę. Zawarta w skrzypie krzemionka ma wpływ na różnorodne procesy metaboliczne organizmu.

Pokrzywa - eliminuje szkodliwe produkty przemiany materii i przyczynia się do zmniejszenia ilości płynów wydalanych przez skórę. Ponadto zawiera bogaty zestaw witamin oraz soli mineralnych.

Melisa - działa łagodząco w stanach napięcia nerwowego i niepokoju oraz związanej z tym nadmiernej potliwości.

Wskazania - Perspi Block, 60 tabletek

Suplement diety polecany osobom mającym problem z nadmierną potliwością.

Przeciwwskazania - Perspi Block, 60 tabletek

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.